

【仿單-正面】 W 95 mm × H 175 mm

“福元”**布朗信錠** 8 毫克  
**Bromhexine** Tablets 8mg “F.Y.”

許可證字號：衛署藥製字第 015344 號

【成分】每錠中含有

有效成分及含量：**Bromhexine Hydrochloride 8 毫克。**

其他成分(賦形劑)：Lactose、Magnesium Stearate、Talc、Calcium Phosphate Dibasic、Corn Starch、Sodium Starch Glycolate、Povidone、Erythrosine。

【用途(適應症)】祛痰。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

※曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。

(二)3 歲以下。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑士：

※孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)不得與含酒精飲料併用。

【用法用量】

年齡	劑量
成人及 12 歲以上	1 次 1 錠，1 天 3 次。
6 歲以上未滿 12 歲	適用成人劑量之 1/2。
3 歲以上未滿 6 歲	適用成人劑量之 1/4。
3 歲以下	請洽醫師診治。

# 【仿單-背面】 W 95 mm × H 175 mm

## 【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情形產生。
2. 有發燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。
3. 嚴重皮膚不良反應(包括：多形性紅斑(erythema multiforme)、史蒂文斯氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿疱症(acute generalized exanthematous pustulosis <AGEP>)(可能症狀：皮膚紅疹、搔癢或水泡；口腔潰瘍；喉嚨痛；眼睛紅腫、灼熱；臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨出現腫脹；發燒)。
4. 類似流感的非專一性前兆症狀(如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛)。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。
5. 過敏反應(hypersensitivity reactions)：過敏反應(hypersensitivity reactions)、過敏性反應(anaphylactic reactions)(包括：過敏性休克、血管性水腫、搔癢症)、皮疹、蕁麻疹。

【包裝】6 ~ 1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲藏條件】請儲存於 25°C 以下，且於有效期限內使用。

LT-T013

福元化學製藥股份有限公司  
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號