仿單

(原方)(紅帽黃身)

治痛安膠囊 200毫克 2020-4-8

size 21x10cm

10cm

21cm

PIC/S GMP優良藥品 衛署藥製字第15986號

ITONFEN ITONFEN ITONFEN

非比林系非類固醇抗炎鎮痛劑

"成大"

治痛安 膠囊200毫克

ITONFEN Capsules 200mg

"Chen Ta"

1. 使用本藥會增加發生嚴重心血管栓塞之機率，包括心肌梗塞和中風，且嚴重的話可能會致命。上述症狀可能發生在使用此藥品的早期階段，且使用的時間越長，機率越大。
2. 進行冠狀動脈繞道手術之後14天內禁用本藥。

【成分】有效成分及含量：Each capsule contains：
Ibuprofen.....200mg
其他成分(賦形劑)：Talc、Corn Starch、Magnesium Stearate、Lactose。
(硬空膠囊 (#2)：帽紅色，身淺黃色
賦形劑：Gelatin、Titanium Dioxide、Cochineal Red A、Sunset Yellow FCF、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Purified Water。)
【用途(適應症)】：慢性僂麻質性關節炎、關節炎及關節痛、神經炎及神經痛、手術及外傷後之消炎鎮痛。
【使用上注意事項】：
一、 有下列情形者，請勿使用：
1、曾因本藥成分引起過敏的人。
2、目前有消化性潰瘍、出血或穿孔的人。
3、曾因使用非類固醇消炎藥導致腸胃道出血或穿孔的人。具反覆發作之消化性潰瘍或出血病史的人。
4、嚴重出血傾向（包括嘔吐時出血、通便出血、血便或黑便）。
5、嚴重肝衰竭。
6、嚴重腎衰竭。
7、服用阿斯匹林（aspirin）或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹或其他過敏反應的人。
8、進行冠狀動脈繞道手術之後14天內。
二、 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1、未滿12歲，65歲以上。
2、孕婦、計畫懷孕或可能懷孕婦女及哺乳婦。
3、曾有消化性潰瘍的人。
4、有凝血功能異常或曾有相關病史的人
5、有肝臟疾病或曾有相關病史的人。
6、有心臟疾病（例如心肌梗塞、心臟衰竭）或曾有相關病史的人。
7、曾有藥物過敏的人。
8、支氣管氣喘的人。
三、 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1、正在使用任何藥品。
2、高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸的人。
3、時常飲用酒精性飲料的人。
四、 其他使用上注意事項:
1、使用本藥只能緩解症狀，無法治療病因。
2、勿超過建議之使用量，若不慎服用過量，應立即停藥就醫，並攜帶外盒包裝以出示醫師參考。
3、本藥未經醫師處方或指示，不得長期服用。
4、若經醫師處方長期使用本藥，應定期回診進行臨床檢查。
5、不得與酒精性飲料併用，可能造成胃出血。

10cm

21cm

ITONFEN ITONFEN ITONFEN

【用法用量】：

年齡	劑量	
成人	一日3粒	分2~3次於飯後服用之
11~15歲	一日2.0~3.0粒	
8~10歲	一日1.5~2.0粒	
小兒5~7歲	一日1.0~1.5粒	

【警語】：
(一) 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

皮膚	皮膚癢、起疹子
消化系統	胃部（肚臍上方）不舒服、腸胃脹氣、便秘、拉肚子
精神及神經系統	抑鬱
其他	頭痛、頭暈

(二) 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1. 已使用本藥用來退燒超過3天或用來止痛超過5天，症狀未緩解或更惡化時。

身體部位	副作用
血液	再生不良性貧血（可能症狀：出血、傷口出血不止、容易感染、發燒、寒顫）、顆粒性白血球缺乏（可能症狀：容易感染、發燒、寒顫）、血小板減少（可能症狀：出血、傷口出血不止）
過敏症	史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症（可能症狀：皮膚紅疹、搔癢或水泡；口腔潰瘍；喉嚨痛；眼睛紅腫、灼熱；臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨出現腫脹；發燒）、氣喘（可能症狀：呼吸出現喘鳴聲、呼吸短促、呼吸困難）
眼睛	視覺異常
耳朵	重聽、耳鳴
肝臟	黃疸（眼白變黃）、肝功能指數GOT/GPT（AST/ALT）異常
消化系統	胃痛或有灼熱感、血便
口腔	口內炎（口腔潰瘍或發炎）
心臟血管系統	心臟衰竭與水腫（可能症狀：疲倦、心跳加速、呼吸困難、浮腫）、心肌梗塞（可能症狀：胸部隱約疼痛、胸悶、呼吸不順暢）、低血壓（可能症狀：暈厥）
其他	體溫過度下降、四肢冰冷

【包裝】:6-1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。
【類別】:醫師藥師藥劑生指示藥品。

成大藥品股份有限公司
台南市麻豆區關帝廟80號