註

（1）報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

（2）仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

諾得®咳嗽膠囊

HC NORITLE® Cough Capsules

【作用特點】

1.Cloperastine hydrochloride作用於咳嗽中樞而呈鎮咳效果。

2.DL-Methylephedrine hydrochloride對支氣管平滑肌有弛緩擴張作用。

3.Chlorpheniramine maleate有抗組織胺作用。

【成分】有效成分及含量Each capsule Cantains

Cloperastine hydrochloride..........................20mg
DL-Methylephedrine hydrochloride..........16.5mg
Potassium guaiacol sulfonate......................80mg
Chlorpheniramine maleate...........................2.5mg

其他成分(賦形劑)

Talc(French chalk)、Microcrystalline cellulose 102、Lactose granule、Magnesium stearate(Eq to stearas magnesium)

【用途(適應症)】

緩解感冒之各種症狀(咳嗽、喀痰、鼻塞、流鼻水、打噴嚏)。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
  (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  (一)6歲以下。
  (二)有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
  (三)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
  (四)有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
  (五)有心臟病及65歲以上的人。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  (一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  (二)正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
  (三)服用鎮靜藥或安眠藥的人。
四、其他使用上注意事項：
  (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
  (二)避免陽光直射。
  (三)勿超過建議劑使用量
  (四)不要服用本藥超過七日。
  (五)可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
  (六)不得與酒精性飲料併用。

【用法用量】

年齡	使用量	
成人及12歲以上	每次1粒	一日3次，配開水服用。

【警　語】

1.服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅
消化系統	噁心、嘔吐、食慾不振
神經系統	頭暈、耳鳴
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊

2.服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(1)若有任何不適情形產生。
(2)咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
(3)症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
(4)喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

【包　　裝】6~1000粒塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【類　　別】醫師藥劑生指示藥品。

儲存於25℃以下

衛署藥製字第016129號

適用藥害救濟制度

委託者：天良生物科技企業股份有限公司
新北市汐止區大同路一段147號9樓
製造廠：合誠化學製藥股份有限公司
桃園市平鎮區工業十路15號©
免費服務專線：0800-251-197