健保代碼：(500ml)A016476277
(300ml)A016476266

“台裕”

甘露醇(邁尼妥)注射液　　衛署藥製字第 016476 號

MANNITOL Injection “TAI YU”

「“台裕”甘露醇注射液」為 Mannitol 之注射水溶液。Mannitol 具有降低腦壓、縮小腦容積作用，故可改善因腦壓亢進所致之諸症狀，而少有腦壓反彈上昇現象；投與後數分鐘即有作用，降腦壓持續時間較長（3~4 小時），並依投與量之比例而延長。Mannitol 亦具有利尿作用，於體內幾不代謝，易濾過腎絲球體，於尿細管無再吸收，呈滲透壓性利尿作用。

成　　分

Each ml contains：

Mannitol 200.0mg
pH：4.5~7.0。
滲透壓比：約 4。

適 應 症

利尿、降低顱內壓、腦水腫、促進毒物之尿中排除、腎小球過濾速率之測定(診斷用)。

用法用量

本藥限由醫師使用。

每公斤體重依 Mannitol 量 1~3gm 靜脈點滴注射，投藥速度為 100ml/3~10 分鐘，每日最大量依 Mannitol 計算為 200g。

【注意事項】

1.急性頭蓋內血腫存在之患者禁用。對疑有急性頭蓋內血腫之患者，應先處理出血根源，確定無再出血之虞後，始可使用本藥(如未經確定血腫之存在而使用本藥時，因腦壓下降而暫時止血者，可能有再度出血之虞)。
2.脫水狀態之患者、尿閉及腎機能障礙患者、鬱血性心不全患者，應慎重投藥。
3.副作用偶有胸部壓迫感、惡寒，間有口渴、電解質失調等脫水症狀。過量投與偶有頭痛、噁心、眩暈等。
4.因滲透壓力之改變，投藥中或投藥後，可能有頻尿或多尿現象，宜作適當之預先處理。
5.本藥為過飽和溶液，貯存中可能有結晶析出，則須先予加溫溶解成澄清液，再冷卻至體溫後，始可注射。注射時宜使用附有濾網之注射器。
6.用前應詳予檢視，如溶液為澄清透明，拍打瓶底如有反彈之中空清脆聲(真空)，方可使用。

【賦形劑】

Water for Injection。

【貯藏方法】

室溫避光貯存。

【包　　裝】

300、500 毫升玻璃瓶裝，100 瓶以下盒裝。
20 毫升安瓿瓶裝，100 支以下盒裝。

台裕化學製藥廠股份有限公司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
TEL：(03)5826655　　FAX：(03)5822389

Ⓑ