

成藥藥品仿單標籤粘貼表 (二)

藥品名稱	永昌的剌美利松錠	申請廠商	永昌化學製藥股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製字第16496號		

副腎皮質荷爾蒙劑

“永昌”的剌美利松錠



Dexamethasone Tablets "Y.C."

(成分) 每錠中含有：**錠**
Dexamethasone.....0.75mg

(適應症)
急性關節炎、風濕性疾患、副腎皮質機能不全症、坐骨神經痛、過敏性疾患、支氣管氣喘、枯草熱、蕁麻疹、白血病、脊髓炎、潰瘍性結腸炎、重症皮膚病。

(用法用量)
初劑量成人每日1.5~3.0mg，分3~4次服用，維持劑量每日0.75mg

本藥須由醫師處方使用。
衛署藥製字第16496號
注意：請詳閱說明書後使用。
製造批號：

 永昌化學製藥股份有限公司
台灣省台中縣大甲鎮興安路148號



88.4.12

副腎皮質荷爾蒙劑
“永昌”的剌美利松錠
 "Dexamethasone Tablets" "Y.C."

衛署藥製字第16496號

本劑含有 Dexamethasone 為 prednisolone 之衍生物，臨床治療效果較同類荷爾蒙劑為強。

【特點】

1. “永昌”的剌美利松錠之抗炎效力較cortisone強35~50倍，較 prednisolone 強7~10倍。
2. “永昌”的剌美利松錠之副作用較少，不會引起鈉滯留和鉀素的喪失，因此不致引起身體浮腫或體重增加。
3. “永昌”的剌美利松錠對糖質代謝作用及血壓亦無影響。

【成分】 每錠中含有：

Dexamethasone.....0.75mg

【適應症】 急性關節炎、風濕性疾患、副腎皮質機能不全症、坐骨神經痛、過敏性疾患、支氣管氣喘、枯草熱、蕁麻疹、白血病、脊髓炎、潰瘍性結腸炎、重症皮膚病。

【用法用量】 初劑量為成人每日1.5~3.0mg分3~4次服用，維持劑量每日0.75mg。本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 急性感染症使用時，請同時併用適當的化學治療劑或抗生素藥品，以治療疾病。
2. 對消化管障礙如胃潰瘍，務請特別注意。
3. 對於有精神病因素者，請多加注意。
4. 服用本劑期間請充分補充蛋白質。
5. 因主要副作用為引起浮腫，血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
6. 糖尿病患者使用時，請注意增加Insulin之用量。

【包裝】 100's 500's 1000.s 瓶裝



永昌化學製藥股份有限公司

臺中縣大甲鎮庄美里興安路148號
 TEL: (046) 877114, 877115, 877116

009436

51