衛署藥製字第 017248 號

解 熱 鎮 痛 劑

“明大”得舒痛錠

Miguzeto Tablets “M.T.”

一般所謂鎮痛劑爲中樞抑制藥之一種，係因以阻止吾人神經感覺上之各種疼痛，本劑配有 Acetaminophen 及 Ethoxybenzamide 其對感冒引起之頭痛或關節痛具有迅速之鎮痛、解熱之卓越效果，並且配合對止痛作用較長，且持久之 Bucetin 及具有鎮靜作用之 Allylisopropyl acetyl urea 及可使止痛作用加強且持續時間延長之 Caffeine 故通常服用 5～10 分鐘，即發揮其強力之止痛作用。

【成　　分】：Each Tablet contains：

Acetaminophen……160mg
Bucetin……..140mg
Ethoxybenzamide…….200mg
Allylisopropyl acetyl urea……...40mg
Caffeine anhydrous……..…50mg

【賦 形 劑】：Aluminum Silicate、Starch、Hisil、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、Pregelatinized Starch、Povidone。

【適 應 症】：解熱、鎮痛（頭痛、月經痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、筋肉痛）。

【用法用量】：通常成人 1 次 1 錠，8～15 歲半錠，1 日 3 次，避免空腹時使用，服用間隔爲 4 小時以上。
本藥須由醫師處方使用。

【警語及注意事項】

(1)肝毒性:

1、使用 acetaminophen (paracetamol) 曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4,000 毫克的 acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 acetaminophen 成分之藥品。

2、過量服用 acetaminophen 可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有 acetaminophen 成分之藥品，因而造成用藥過量。

3、有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有 acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4,000 毫克的 acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

(2)與酒精併用:不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

(3)過量:

1、服用過量 acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括:胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。

2、本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。

3、Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括:噁心、嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。

(4)過敏/過敏性反應:上市後曾有發生與使用 acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對 acetaminophen 過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

(5)嚴重皮膚反應:使用 acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病 (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis,AGEP)、史蒂文生氏-強生症候(Stevens-Johnson Syndrome,SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis,TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

(6)本劑含有劇藥，應切實按照所訂服用方法及劑量使用。

(7)在就診中尚使用其他解熱、鎮痛或感冒藥者，應避免重複使用。

(8)服用本劑數次仍未見症狀改善時，應即停用。

(9)避免長期服用。

(10)本劑應置於小孩伸手不及處。

(11)對投與本劑之患者，請勿使其從事如汽車駕駛等有發生危險的可能性 之機械操作。

(12)對本劑有過敏症之患者應注意。

(13)慎重投與：

1、對肝、腎有障礙的患者。

2、高齡者、虛弱者（恐會發生呼吸抑制者）。

3、呼吸機能低的患者。

4、小孩。

(14)副作用：

1、依存性：由連續使用而致有藥物依存的傾向應充分觀察其經過，投與期間慎重注意用量，投藥量急需減少或中斷時稀有生戰慄，不安等之禁斷症狀。故應徐徐減少而後中止投藥。

2、過敏症：如發疹、紅斑、搔癢感等之過敏症狀發生時，應即中止。

3、消化器：有時會發現噁心、嘔吐、下痢等之症狀。

4、精神神經系：有時有頭痛、目眩、知覺異常、難聽、興奮、運動失調、發音異常等。

5、其他：有時會發熱。

(15)妊婦的投與：對胎兒有傷害的可能性，故勿投與。

(16)相互作用：飲酒或不得不併用（Phenothiazine 誘導體，Barbitol 誘導體之中樞神經抑制劑）時，應慎重投與。

【包　　裝】：6～1000 錠瓶裝、盒裝。

【儲存條件】：室溫(15~25℃)儲存，避免陽光直射。

PIC/S GMP 優良藥廠
明大化學製藥股份有限公司
台中市外埔區水美里水美路 52 號
電話：04-26870115~7