

“漁人”咳安糖漿

衛署藥製字第 017320 號

【主成分】: Each ml contains :

Codeine Phosphate.....0.48 mg
DL-Methylephedrine Hydrochloride.....1 mg
Chlorpheniramine Maleate.....0.2 mg
Potassium Guaiacolsulfonate.....3 mg
Platycodon Fluid Extract.....0.06 ml

【賦形劑】: Sucrose, Caramel, Grape Essence, Plum Flavour, Sodium Dehydroacetate, Polygen、Potassium Metabisulfite, Sodium Polyphosphate, High Fructose Syrup, Purified water.

【適應症】:

鎮咳、祛痰(支氣管炎、咽喉炎、感冒引起之咳嗽及喀痰)。

【用法用量】:

通常成人(15歲以上)一次量 10ml，15歲以上，適用成人劑量。
11歲以上未滿 15歲，適用成人劑量之 2/3。
7歲以上未滿 11歲，適用成人劑量之 1/2。
3歲以上未滿 7歲，適用成人劑量之 1/3。
3歲以下之嬰幼兒，使用前請洽醫師。
一日三次服用，醫師藥師藥劑生指示藥品。

【副作用】:

輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【注意事項】:

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師、藥師或藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 液劑使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

【警語】:

1. 長期使用易致成癮。
2. 吸菸、慢性阻塞性肺炎(Chronic Obstructive Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽患者請勿自行服用。
3. 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
4. 祛痰劑宜空腹服用。
5. (1) 早產兒，1歲以下嬰兒及 1~2 歲幼兒，不建議使用。
(2) 2~12 歲兒童，依年齡減量使用。
(3) 肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

【包裝】: 10-90 毫升玻璃瓶裝

【貯存】: 請置於 25°C 以下陰涼乾燥處

委託者：漁人製藥股份有限公司
製造廠：臺灣派頓化學製藥股份有限公司

地址：高雄市左營區民族一路 707 號
地址：高雄市岡山區為隨東路 50 號