

“強 生” **過 敏 寧 膜衣錠**  
**CABIDRIN F.C. TABLETS "JOHNSON"**

衛署藥製字第018444號

**【成 分】有效成分及含量：**

Carbinoxamine Maleate..... 2.5mg  
 Pseudoephedrine Hydrochloride..... 60mg  
 其他成分(賦形劑)：Avicel 101、Cyclamate Sodium、Densil、Eudragit E100、HPMC 606、  
 Hydroxypropyl Cellulose L、Magnesium Stearate、Methycellulose 25 cps、PEG 6000、Sodium  
 Saccharin、Sodium Starch Glycolate、Starch、Talc、Tartrazine Aluminum Lake、Titanium Dioxide。

**【用途(適應症)】**緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）。

**【使用上注意事項】**

- 有下列情形者，請勿使用
  1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
  2. 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)的人，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用的藥品是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治
  1. 3歲以下。
  2. 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
  3. 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
  4. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
  1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  2. 65歲以上。
  3. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
  4. 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
- 其他使用上注意事項
  1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
  2. 避免陽光直射。
  3. 勿超過建議使用量。
  4. 不得與酒精性飲料併用。
  5. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

**【用法及用量】**

年齡	劑量
成人及12歲以上	一日4次，每次間隔4小時以上服用，一次一錠。
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2。
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4。

**【警 語】**

- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮
其他	口乾、視覺上之困擾

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

**【包 裝】**8~28錠 PTP鋁箔盒裝。

**【類 別】**醫師藥師藥劑生指示藥品。

**【儲 存】**本藥應儲存於25°C以下緊密容器。



Code No.:E-12

**強生化學製藥廠股份有限公司**

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241三重區三和路四段77、79號  
 訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579  
 工廠電話：(02)22878405