

G.M.P.藥品

衛署藥製字第 019197 號

“合成”

斯利胃錠

SILIWELL TABLETS

◆成分：每錠中含有：

Simethicone-----	20mg
Dried Aluminum Hydroxide Gel-----	200mg
Magnesium Hydroxide-----	200mg

◆作用：

- 1、**Simethicone**：具有消泡作用，對於消化器疾患所併發之腹部膨脹感，具有氣體排除作用。
- 2、**Dried Aluminum Hydroxide Gel**：服用後在胃中形成乳狀膠體，中和胃酸。
- 3、**Magnesium Hydroxide**：直接中和胃酸，緩和氫氧化鋁可能引起的便秘。斯利胃錠嚼碎後服用，可發揮制酸、消脹的功效。

◆適應症：

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

◆用法用量：

- 1、一天3次，或需要時服用。成人每次2錠；12歲以上，適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次1錠；3歲以上未滿6歲，每次1/2錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。
- 2、應嚼碎後吞服。

醫師藥師藥劑生指示藥品

◆注意事項：

- 1、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 2、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

◆警語：

- 1、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (1)對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。
 - (2)未滿3個月之嬰兒不得服用。
 - (3)一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 - (4)制酸劑不得併用其他藥品。
 - (5)單次劑量(2錠)之酸中和能力為17.5mEq，鎂含量為13.7mEq。
- 2、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 3、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 4、本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。
- 5、本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

◆包裝：12~1000 錠塑膠瓶裝，P.T.P 盒裝。

委託製造者：合成藥品股份有限公司

高雄市新興區洛陽街11號5樓之6

製造廠：臺灣派頓化學製藥股份有限公司

高雄縣岡山镇為隨東路50號