衛署藥製字第 019483 號

“金田”暈必安錠 50 毫克(氯茶鹼二苯安明)

Yunbian Tablets 50mg "C.T."

(Dimenhydrinate)

【前　　言】

本劑為 *Diphenhydramine* 與 *8-chlorotheophylline* 之化合物。對於治療及預防運動性眩暈，如暈車、暈船、暈飛機。這些運動性眩暈，其起因係為支配人體位置之感覺(就是內耳的三半規管)，由於乘車、船、飛機之不規則搖動與加速而失去平衡致使腦中樞及自律神經系受到刺激，被興奮，而發生嘔吐、噁心、眩暈。

【成　　份】

Each tablet contains:

Dimenhydrinate.....50mg

【特　　點】

本劑服用約廿分鐘後見效，以啟程乘車、船、飛機三十分鐘前服用一錠後不發生暈車、暈船、暈飛機能持續 4~5 小時的效果。

【適 應 症】

預防或緩解動暈症（暈車、暈船、暈機）引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

【用法用量】

預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前 30-60 分鐘服用之，成人 1 次 1 錠。必要時，可於持續搭乘交通工具或症狀出現時再行服用。每次間隔時間應在 6 小時以上，24 小時內不可超過 4 次。

12 歲以上，適用成人劑量。

6 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2。

6 歲以下之兒童，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

一、爲防止兒童誤食請妥善保管。

二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦、可能懷孕婦女及授乳婦不建議自行使用。

四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

五、液劑使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

六、不得併服含酒精飲料。

七、服用本藥若有不了解之處，請洽詢醫師藥師藥劑生。

【警　　語】

一、服用本藥後，可能引起思睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)，老年人應小心使用本藥，如症狀持續加強，宜停藥就醫。

二、除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(一)、6 歲以下不建議自行使用。

(二)、曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。

四、下列病患使用鎮暈藥前，應詢問醫師藥師藥劑生：

(一)、接受醫師治療並服用藥物者。

(二)、大於 65 歲以上者。

(三)、本人或家族具過敏體質者。

五、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺功能亢進、腎臟病者不得服用。

六、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑、安眠劑及其他含有抗組織胺成分之內服製劑(如其他鎮暈藥、綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等)。

七、如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難，請勿服用此藥。

八、服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。

九、如發生皮膚發疹、發紅、癢疹、頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢等症狀時，請停止服用，並持藥品包裝及說明書，詢問醫師藥師藥劑生。

包裝：8~1000 錠塑膠瓶裝

儲存條件：室溫(25℃)以下

金田製藥股份有限公司

彰化縣二水鄉員集路四段 67 號