

“杏輝”

PIC/S GMP 藥品

杏化潤[®]柔滋霜

SINPHARDERM-HC[®] Cream

“Sinphar”

—— 皮膚抗炎乾裂治療劑 ——
(Anti-inflammatory Xerosis Preparation)

杏化潤柔滋霜含有Urea及 Hydrocortisone acetate 之複合配方，可達協同作用，增加本劑對於皮膚疾患之治療效果。Urea—為可暫時緩解皮膚刺激或角質軟化之成分，可增加皮膚之保濕作用，並軟化粗糙乾裂、魚鱗化之皮膚，使皮膚回復正常功能。Hydrocortisone acetate—能有效控制皮膚炎症狀、濕疹及搔癢，並可降低Urea於皮膚所造成的刺激及敏感性。

【成分】

有效成分及含量：每gm含：

Hydrocortisone acetate.....10mg

Urea.....100mg

其他成分(賦形劑)：Propylene Glycol、Cetyl Stearyl Alcohol、White Soft Paraffin、Liquid Paraffin、Span 60、Tween 60、Methylparaben、Propylparaben、Sodium Bisulfite、Edetate Disodium、Citric Acid、Monohydrate、Sodium Citrate、Water Purified。

【用途(適應症)】暫時緩解濕疹、尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患的症狀。

【使用上注意事項】

1、有下列情形者，請勿使用：

(1)曾因本藥成分引起過敏。

2、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(1)3歲以下。

(2)有深部皮膚組織感染。

3、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(1)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(2)要使用於臉部。

4、其他使用上注意事項：

(1)為防止兒童誤食請妥善保管。

(2)避免陽光直射。

(3)勿超過建議使用量或使用次數。

(4)使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。

(5)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

(6)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

(7)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。

(8)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

(9)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

(10)請勿使用於患部以外，也勿當作預防使用。

(11)本藥不可連續使用超過7天。

(12)皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

(13)小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。

(14)臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

(15)癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

【用法用量】1天2至4次，塗擦薄層，以可覆蓋患部為主。

【警語】

1.使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

2.使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(1)若有上述外之其他不適情況產生。

(2)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】1000公克以下塑膠瓶、塑膠軟管、鋁管裝。

【儲存】25℃以下保存。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

衛署藥製字第019614號



® 杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
消費者服務專線：(0800)015151 website：http://www.sinphar.com