〝杏輝〞 PIC/S GMP 藥品

杏聯® 軟膏

SINQUART Cream 〝Sinphar〞

── 黴菌、癬菌治療劑 ──

(Antifungal Agents) (黃色)

本軟膏為一種廣效性局部皮膚治療劑，含四種不同藥理作用的主成分，具有抗發炎、止癢、殺菌和殺黴菌作用。

【成分】

有效成分及含量：每gm含：

Betamethasone (as 17-Valerate).....0.5mg
Gentamicin(as sulfate).....1mg
Tolnaftate.....10mg
Iodochlorhydroxyquin 10mg

其他成分(賦形劑)：

Propylene Glycol、Cetostearyl Alcohol、White Soft Paraffin、Liquid Paraffin、Span 60、Tween 60、Chlorocresol、Sodium Bisulfite、Edetate Disodium、Food Color Yellow NO.5、FD&C Blue NO.1、Water Purified、Perfume(Melatti Wes Extract).

【用途(適應症)】

治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑。濕疹或皮膚炎。急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。

【使用上注意事項】

1、有下列情形者，請勿使用：
(1)曾因本藥成分引起過敏。
2、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(1)有深部皮膚組織感染。
(2)3歲以下。
3、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(1)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(2)正在接受醫師治療。
(3)患部在臉上。
(4)患部化膿。
4、其他使用上注意事項：
(1)為防止兒童誤食請妥善保管。
(2)避免陽光直射。
(3)勿超過建議使用量或使用次數。
(4)使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
(5)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
(6)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，濕疹，浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
(7)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
(8)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
(9)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
(10)一般黴菌感染療程為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。
(11)皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
(12)小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
(13)臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
(14)類固醇抗發炎劑不可連續使用超過二星期。
(15)會使衣物染色。
(16)長期使用有可能引起繼發性感染。

【用法用量】一天2次，塗於患部。

【警語】

1、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。 刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、菲子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。 繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、嗯心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

2、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(1)若有上述外之其他不適情況產生。

(2)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

(3)一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使症狀改善，若停藥後，病情復發亦應立即就醫。

【包裝】100公克以下鋁管、積層鋁管裝，100公克以下、450公克、1000公克塑膠罐裝。

【儲存】室溫(25℃)以下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。　　衛署藥製第019615號

PIC/S GMP
Sinphar® 杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.
台灣宜蘭縣冬山鄉中山村84號
84, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN
服務專線：(0800)015151　　web site：http：//www.sinphar.com