

衛署藥製字第19669號

## "美西"甜兒菜感冒熱飲 顆粒

### SWEET GRANULES "MEY SEE"

每公克中含：

【主成分】Chlorpheniramine Maleate.....0.5mg  
Acetaminophen.....25mg  
Salicylamide.....45mg  
Caffeine anhydrous.....5mg

【賦形劑】Citric Acid、Mannitol、Orange powder、Potato starch、Propylene glycol、Purified Water、Povidone、Riboflavin、Sodium Bicarbonate、Silicon Dioxide

【適應症】

緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏)。

【用法用量】

一日3至4次。飯後半小時內服用為宜。18歲以上，每次4公克(1包)。

請將本產品倒入一般杯子或馬克杯中，慢慢加入溫開水(水溫約60°C)，攪拌均勻後，再依個人喜好加入溫水至約100c.c.(一般紙杯之六分滿)，立即服用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

一、為防止兒童誤食請妥善保管。

二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：

(一)、孕婦及授乳婦不建議自行使用。

(二)、服用本藥時不得併服其他藥品。

四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

五、不得併服含酒精飲料。

【警語】

一、服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。

二、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(一)、18歲以下不建議自行使用。

(二)、曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。

三、患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。

四、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。

五、若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。

六、吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。

七、不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。

八、不要服用本藥超過七日。

九、服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。

十、服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。

十一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(一)、酒精警語：不得併服含酒精飲料，因可能造成肝損害及胃出血。

(二)、本藥不得使用於18歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群(Reye's Syndrome)。

(三)、曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。

(四)、蠶豆症(6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency)患者，不宜服用本藥。

(五)、懷孕第三期婦女不得使用。

十二、本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：

(一)、服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要合併飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。

(二)、除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。

十三、本藥含咖啡因類成分，應注意下列事項：

(一)、應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

(二)、為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【包裝】6-250包鋁箔袋裝(每包4公克)。



美西製藥有限公司  
高雄市仁武區工業一路九號

