

“回春堂”莫痢錠

BSB Tablets “H.C.T.”

衛署藥製字第 019780 號

「成份分量」：每錠中含有

Berberine Tannate	25mg
Scopolia Extract	10mg
Benzocaine	50mg

「適應症」：

胃痛、細菌性腹瀉、痢疾、急慢性腸炎、消化性發酵異常。

「用法用量」：

通常成人 1 次 2 錠，8-14 歲 1 次 1 錠，3-7 歲 1 次 1/2 錠，並依年齡、症狀酌予增減之。

本藥須經醫師處方使用

「臨床所見」：

腹瀉乃不成形的糞便反覆排出之謂，其可說是排除腸管內有害物質之防禦生理現象，為消化道器官性疾患的症狀。一般言之，腸機能之急性障礙比較常見，而通常都是以腹瀉的姿態出現，本來健康的人，突然排出稀便，通常都是因為感染而來，很少是因為吃了本已存在的毒素，毒物或放射性物質等所引起的，而從病人的病史中，就不難找出問題的來源：例如吃了某一種食物之後，同桌吃食的人也在吃飯 24 小時之內得到一樣的症狀，則證明是吃了早已存在的毒素所致；如果在食後 24-72 小時之內有些人發生了腹瀉，則應懷疑是沙門氏菌感染所致，如果有發燒、倦怠、肌酸痛、上腹或肛臍周圍不舒服感，加上嚴重之食慾不振，則表示小腸有炎症疾患的關係。引起下痢之原因：

(1)消化不良性下痢

不消化之物質可對腸粘膜產生機械性的刺激，促進腸蠕動後，又消化不良會有氣體之產生，刺激腸粘膜使蠕動亢進，腸內容物迅速地向肛門移動，減少水份之吸取，致使糞便中水份增多，引起下痢。

(2)胃性下痢

胃中鹽酸分泌不足，而對細菌無法產生殺菌作用，在腸內引起異常發酵，產生氣體，而對腸粘膜施以刺激，又鹽酸分泌不足，會引起消化不良，不消化的物質，對腸粘膜亦會產生機械的刺激，蠕動亢進引起下痢。

(3)神經性下痢

不安、發怒等，自律神經之平衡破壞，副交感神經興奮，腸運動增強，內容物之通過迅速，水份吸收減少，而使糞便中水份增多，排便次數增加，引起下痢。

(4)腸卡他爾性下痢

所有引起下痢之原因中，以腸卡他爾居最多數，腸卡他爾乃細菌由感染、分泌毒素或感冒、服用瀉劑之中毒、腸內異物、寄生蟲之刺激，使粘液分泌較多，粘膜充血引起浮腫，及浮腫之破裂受損傷所致。在腸卡他爾之情況下，沒有經過良好消化，未吸收的物質，會慢慢地往大腸推進，而刺激大腸粘膜，蠕動增加，物質通過速度變快，大腸之水份吸收作用減弱，糞便中水份增多，引起下痢，其可能伴有發燒之現象。

「藥理作用」：

(1)Berberine Tannate

經口投予很難為胃腸道所吸收，直接於胃腸道產生抗原蟲及殺菌的功能(其乃由於 Berberine 可攪亂 Amino Acid 的代謝，則細菌不能營正常之代謝所致)，而可治療一些細菌性腸疾患，經由動物及臨床實驗得知，其可抑制阿米巴原蟲、霍亂弧菌、大腸桿菌及赤痢菌感染所引起之下痢，但不會產生經由注射所引起之副交感神經興奮，腸蠕動亢進之現象，此外，亦具有整腸的作用，以防止消化不良及腸內異常發酵的產生，又其鹽基 Tannic Acid 具有收斂的作用，即與蛋白質及其他含氮化合物結合，於粘膜或損傷之組織形成一層不溶性保護膜，

以防止粘膜之刺激。並可抑制粘液和其他腺體之分泌，及細胞之滲透性，而產生組織乾燥的作用，應用於下痢的治療，再說，Berberine Tannate 比其他之 Berberine 製劑不苦，可以研細服用之。

(2)Scopolia Extract

為副交感神經抑制劑，即俗稱之鎮痙止痛劑。因自主神經的不安定，尤其是副交感之神經興奮，會增加大腸的蠕動，減少大腸對水份之吸收，使其分泌亢進而引起下痢，而本劑之加入對胃腸道有明顯抑制蠕動的作用，緩解其運動機能異常亢進之緊張痙攣而產生鎮痛、鎮痙的效果。

(3)Benzocaine

為局部麻醉劑，具有表面之麻醉作用，廣泛的應用於粘膜皮膚的局部病變，可阻斷區域性神經，產生知覺麻痺，由於適用範圍不同，供給不同濃度，強度及劑型之製劑，加於此製劑中，於胃中迅速的產生止痛效果。

莫痢錠中 Berberine Tannate 之腸內殺菌及腸管粘膜收斂，消炎作用，Scopolia Extract 之鎮痛、鎮痙分泌抑制的作用及 Benzocaine 之局部麻醉作用，由於各成份的合理配合，而產生良好之止痛、止瀉、整腸效果。

「副作用及注意事項」：

(1)Scopolia Extract 可能會產生口渴、便秘、視力障害、皮膚發紅、心悸、頭痛、眩暈、倦怠感、噁心等胃腸障害，青光眼、尿滯留之患者禁用。

(2)Berberine Tannate 可能產生副交感之神經興奮，Tannic Acid 些微由組織吸收而產生損傷。

(3)

i 本藥品含 Benzocaine 成分可能造成罕見但嚴重的變性血紅素血症 (Methemoglobinemia) 之不良反應。若在用藥後(通常於 2 小時內)發生虛弱、精神混亂、頭痛、呼吸困難，或皮膚顏色呈現蒼白灰色或藍色，可能是變性血紅素血症之症狀，請立刻停止用藥，並且諮詢醫師。

ii 本藥品勿大量或大體表面積使用，儘可能以可達預期療效之最少劑量使用。

iii 對 Benzocaine 成分藥品過敏之病人請勿使用。

iv 本藥品應小心謹慎用於兒童。

v 民眾在貯放該類藥品時，應放置於兒童無法觸及處，以免誤用藥品。

vi 除非在醫療專業人員的建議及監督下，該類藥品勿使用於 2 歲以下之嬰幼兒，成人亦應遵循仿單(藥品說明書)相關內容使用。倘若於用藥期間有任何不適或疑問，應立即就醫。

「包裝」：2~1000 錠塑膠瓶裝

「貯存」：超過包裝上所標示的使用期限(EXP)之後，請勿使用。

請勿儲存於超過 30°C 的環境下，儲存於原包裝內。



電腦代號 TG51

ITG510