

非比林系之感冒治療劑

人生安風樂 糖衣錠

Anpholone S.C. TABLETS JEN SHENG

本品不含Pyrazolone系藥劑，因此對具有引起比林疹等藥物疹的特異體質患者，可以安心投藥，本藥副作用少，同時具有優良之臨床效果，其特長：

1. Ethoxybenzamide
其為Salicylamide衍生物之一，鎮痛效果較Salicylamide強2~3倍解熱效果更為強大而具有持久性，其副作用以及對胃腸障礙之引起，則較Aspirin和Salicylamide少。
2. Bucetin
為Phenetizine誘導體，除有解熱作用外，尚具有優於Phenacetin之鎮痛效果，其毒性僅為Phenacetin之三分之一，與Ethoxybenzamide併用所呈現之鎮痛作用，具有極為突出之相乘效果，尤其是兩者配合所呈現之毒性，並無相乘作用之發生，因此二者之配合可說極為有利而合乎吾人之配藥要求。
3. dl-Methylephedrine HCl, Guaiacol Glycerol Ether
其為強力支氣管擴張作用，能抑制咳嗽的發作，且能消除鼻粘膜之充血，而緩和鼻塞，及鎮咳、祛痰作用。
4. Chlorpheniramine Maleate, Caffeine Anhydrous
Chlorpheniramine Maleate是抗Histamine劑中具強力功效者，且睡意、頭痛等副作用少，能抑制感冒的過敏性症狀，Caffeine能促進腦血管之血液循環，而幫助藥效之運行。
5. Thiamine Disulfide, Riboflavin
能恢復因感冒而消耗的體力，並增強抵抗力。

上述各種成份的功效互相協助之下，能發揮如下之特徵：

- (1)具有強力之解熱、鎮痛作用。
- (2)對過敏性之感冒亦俱效。
- (3)能抑制因感冒引起之消耗。
- (4)易出藥疹及胃腸衰弱之患者，亦可安心服用。

【成 分】

Bucetin.....	90mg
Ethoxybenzamide.....	90mg
Caffeine Anhydrous.....	15mg
Chlorpheniramine Maleate.....	1.25mg
dl-Methylephedrine HCl.....	5mg
Guaiacol Glycerol Ether.....	25mg
Thiamine Disulfide.....	2.5mg
Riboflavin.....	1.25mg

【適應症】

緩解感冒之各種症狀（鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛）。

【用法用量】

通常15歲之成人1次1錠，一日3~4次，11歲~15歲，適用成人劑量之2/3，7歲~11歲，適用成人劑量之1/2，3歲~7歲，適用成人劑量之1/3，3歲以下之嬰幼兒，使用前請洽醫師。本藥須經藥師、藥師生或醫師指示使用。

【副作用】

Caffeine（咖啡因）

神經質、興奮、睡不著與心悸加快。

Chlorpheniramine Maleate

嗜睡、口乾、倦怠感、視覺模糊、錯亂、小便困難、心跳加快。

dl-Methylephedrine HCl

神經質、不安靜、燥動及睡眠困難。

【警 語】

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，3歲以下不建議自行使用。
3. 含咖啡因之本類製劑，12歲以下之患者不得服用。
4. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
5. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
6. 吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本類藥品。
7. 服用抗組織胺之本類藥品後，駕車或操作危險器械時要小心。
8. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，下列病患勿服用含抗組織胺之本類藥品：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
9. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
10. 不要服用本類藥物超過七天。
11. 服用本類藥品後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三天，應停藥立即就醫。
12. 服用本類藥品後，如果喉嚨疼痛持續二天以上並有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
13. 服用本類製劑應限制再服用含咖啡因藥品、飲料（如：茶、咖啡、可樂等），過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮與失眠，且常會引起心悸過速。
14. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，有心臟病或高齡者不得服用此類製劑。

【注意事項】

1. 需置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

【包 裝】

100錠，200錠，500錠，1000錠瓶裝，

10×10錠銀箔PTP盒裝。

衛署藥製字第19944號



G.M.P.合格藥廠
人生製藥股份有限公司
台灣台中市台中工業區五路3號
JEN SHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
TAICHUNG TAIWAN