抗過敏性製劑　　衛署藥製字第 20144 號

"易陽"力排敏糖衣錠

Lipaimin S.C.Tablets〝Eayung〞

【簡介】

肝臟在吾人體內諸代謝器官中，甚為重要。肝臟能將各種營養素變成動物澱粉而貯藏之，並可將體內產生之有害物質及本自體外之毒物，予以解毒。當吾人罹患疾病或飲酒過量，致肝臟能衰弱時，則全身營養即不能充分分配，解毒機能亦將低下。因此不但肝臟發生障礙，全身亦將引起種病症。而"易陽"力排敏糖衣錠之作用即為促進肝臟之功能，預防或治療肝臟之疾病，並增強解毒作用。

【成分】

Each Tablet Contains：

Orotic Acid.....30mg

Glycyrrhizin.....50mg

Chlorpheniramine Maleate.....5mg

【賦形劑】

Lactose

Potato Starch

Magnesium Stearate

Sugar Coating：Shellac、Gelatin、Acacia、Sucrose、Calcium Phosphate Dibasic、Food Color Red No-6、Food Color Blue No-2、Food Color Yellow No-4、Alcohol、Wax-103

【作用特點】

為構成核酸之前驅物質，具有如下作用：

1. 蛋白質代謝作用：因利用已吸收蛋白質及氨基酸等營養之亢進，故有促進生長因子作用。
2. 解毒作用：與 Glucuronic acid 結合，增進其解毒功能，且比單獨使用時強。
3. 糖質代謝作用：本品可促進動物澱粉在體內之生長及乳腺之乳糖生成。
4. 脂質代謝作用：使血液中之 Cholesterol 正常化。

【效能】

蕁麻疹、濕疹、皮膚炎、過敏性疾患。

【用法用量】

通常成人一次一錠，一日服用 2～3 次，兒童依年齡遞減，本藥須經醫師處方使用。

【包裝】100、500、1000 粒瓶裝。

【注意事項】

1. 因有睡意服藥時勿駕車及操作危險機器。
2. 飲酒或併用中樞神經抑制劑時，會增加彼此間之作用，應注意減量投藥。
3. 動物試驗雖無畸形作用之報告，但孕婦使用時仍需小心。
4. 避免大量長期使用。

委 託 者：**易 陽 實 業 有 限 公 司**

高雄市前鎮區崗山北街 341 巷 3 號

製 造 廠：**永 吉 製 藥 股 份 有 限 公 司**

屏東縣萬丹鄉萬丹路三段 91 號