2017.03.

"中美"舒達胃懸液劑

sof well SUSPENSION "C.M."

衛署藥製字第020418號

【成　　分】

有效成分及含量 Each ml contains：

Aluminum Hydroxide.....40mg
(as Dried Aluminum hydroxide Gel.....52mg)
Magnesium Hydroxide.....40mg
Simethicone.....4mg

單次劑量（10ml）之酸中和能力為25.0mEq，鎂含量為13.7mEq。

其他成分(賦形劑)：Glycine、Methylparaben、Saccharin soluble、Xanthan gum、Tween 80、Sorbitol solution、Orange essence、Mint flavor、Propylparaben、Purified water

【用途(適應症)】緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
（一）曾因本藥成分引起過敏的人。
（二）未滿3個月之嬰兒
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
（一）3歲以下之嬰幼兒。
（二）如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
（三）消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
（四）腎臟衰竭的人。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
（一）孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
四、其他使用上注意事項：
（一）為防止兒童誤食請妥善保管。
（二）避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
（三）勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
（四）使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
五、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis Encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。
六、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
（一）對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中乳糖含量不得超過5g。
（二）一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
（三）制酸劑不得併用其他藥品。

【用法用量】

年齡	每日使用次數	每次劑量
成人及12歲以上	一天 3 次，或需要時服用	每次10ml(1/2包)
6歲以上未滿12歲	一天 3 次，或需要時服用	每次5ml(1/4包)
3歲以上未滿6歲	一天 3 次，或需要時服用	每次2.5ml(1/8包)
3歲以下之嬰幼兒	請洽醫生診治	

【警　　語】一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
消化系統	便祕、噁心、嘔吐、腹瀉

二、使用後症狀未改善或更嚴重時，請立即停用，並接受醫師診治。

【類　　別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【包　　裝】60-1000毫升(ml)塑膠瓶裝、3-50包鋁箔袋裝（每包20毫升(ml)）

【儲　　存】25°C以下避免儲存。

委託者：
興中美 生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區基湖路35巷6號5F

製造廠：
C.M. 中美
PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號　諮詢專線：04-7524166
http://www.chungmei.com.tw