

用法用量：通常成人一次1公克～2公克，一日三次，每飯後經口投與，依年齡症狀適宜增減。(所附量匙為1Gm) 本藥須經醫師指示使用。



成大藥品股份有限公司
台南縣麻豆鎮關帝廟80號

GMP

衛署藥製字第020693號

成大藥品
股份有限公司

Lowes Lowes Lowes Lowes Lowes Lowes Lowes

79.12.18

消化酵素劑

“成大”樂胃食 顆粒

“Chen Ta” **Lowes** Granules

消化劑大都為具有活力之酵素，由動物或植物體中提得，凡缺乏消化力之病者，可用之以增加其力，將食物中之蛋白質、脂肪、醣等成分分解，使滋養系統易于吸收。適用於蛋白質、脂肪與碳水化合物之消化失常，亦適用於植物纖維素食物之分解力，如鼓腸、酵解性消化不良等，本品又可用於預防飲食習慣之遽變而引起之胃腸障礙。

成 分：每公克顆粒中含有：

Biodiastase 100.....	50mg
Newlase.....	30mg
Lipase AP6.....	12mg
Cellase AP3.....	5mg
Pancreatin.....	40mg

特 點：
1. Biodiastase係一種強力的綜合酵素，含消化澱粉的 amylase消化蛋白質的protease，消化脂肪的Lipase 消化纖維素的cellase,另含三十多種酵素，具備有人體內所分泌之消化酵素。
2. Lipase對脂肪有強力消化作用，Newlase消化蛋白質， cellase AP3消化纖維，分別與Biodiastase發揮協力作用而幫助食物中脂肪及蛋白質、纖維素之消化、吸收及利用。
3. Pancreatin為自豬或牛之胰腺中提得之碳水化合物，脂肪及蛋白質分解酵素，在適當之酸度下發揮其作用，適用於消化不良、胰腺外分泌障礙之治療。

適 應 症：消化不良、消化不良引起之急性胃腸障礙、手術後消化力減退、胃切除及胃腸器官手術後之消化障礙。促進食慾，增強營養分之吸收。

用法用量：通常成人一次1公克～2公克，一日三次，每飯後經口投與，依年齡症狀適宜增減。(所附量匙為1Gm) 本藥須經醫師指示使用。

包 裝：100公克、500公克、1kg瓶裝。



成大藥品股份有限公司

台 南 縣 麻 豆 鎮 關 帝 廟 8 0 號