“榮民”

康胃星 懸濁液

Antasil-B Suspension “VPP”

衛署藥製字第021064號

本品為由氫氧化鋁及氫氧化鎂組成的混懸液，可解除與胃酸過多相關的胃部不適，對於與胃和十二指腸潰瘍相關之胃酸過多具療效，本品為鋁與鎂共存於組成中，可平衡鋁之便祕性與鎂之緩瀉性。

【藥理作用】

1. 制酸劑--藉化學反應中和或緩衝既有之胃酸量，但並不直接影響胃酸的分泌量。此一作用導致胃內容物pH值的升高，因而解除胃酸過多的症狀。
2. 本藥口服後，僅有少量的鋁(Aluminum)和約10%鎂(Magnesium)會從腸中被吸收。
3. 本藥作用時間長短主要由胃排空時間決定，若飯後1小時投藥，藥效可維持3小時，但在禁食病人則只有20~30分鐘。
4. 本藥主由腎和糞便排泄，約有15~30%所形成的鹽類可被吸收並由腎臟排泄。

【成分】

有效成分及含量：每 g 含

Magnesium Hydroxide wet gel (30% w/w) ..... 133.2 mg

Aluminum Hydroxide wet gel (10% w/w) ..... 240.0 mg

其他成分(賦形劑)：Methylparaben、Propylparaben、Sorbitol Solution 70%、Xanthan Gun、Glycerin、Menthol、Alcohol 95%、Strawberry Flavor、Purified Water。

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】

一、 有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 3歲以下。
2. 消化道潰瘍或出血的人。
3. 有腎臟疾病的人。
4. 腎衰竭病患(長期服含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用)。
5. 有下列醫療問題時：
   (1) 腸胃疾病，例如闌尾炎、潰瘍性結腸炎、憩室炎、大腸發炎症狀、腸阻塞等。
   (2) 胃腸手術，例如結腸造口術、迴腸造口術。
   (3) 慢性腹瀉。
   (4) 便秘。
   (5) 痔瘡。
   (6) 骨折。
   (7) 血內磷酸鹽過少。
   (8) 內分泌失常，胃泌素瘤(Zollinger-Ellison Syndrom)、多發性內分泌腺瘤和全身性著色性蕁麻疹的人。

三、 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 與其他藥品併用時。

四、 其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量。
4. 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
5. 使用前須搖勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
6. 常見於老年人的代謝性骨病(Metabolic Bone Disease)會由於長期使用含鋁制酸劑所造成之磷耗竭、高鈣尿症和腸氟化物的抑制，而使病情加劇。
7. 長期過量使用含鋁制酸劑會造成血清磷濃度降低。
   長期過量使用含鎂制酸劑會造成血清鉀濃度降低。
8. 長期服用本藥，尤其是腎功能不全者，應每隔一段時間做以下的檢測：
   (1)腎功能。(2)血清鈣濃度。(3)血清磷濃度。
   (4)血清鉀濃度。
9. 如果在正規投藥方式下忘記服藥須立刻追服，若已接近下次服藥時間，則勿再服用，不可加倍劑量服用。
10. 過度使用本藥會抑制胃蛋白酶之消化活性，當胃內容物pH為4或高於4時，此酶便失效。
11. 長期使用於骨折病人應補充適當膳食磷酸鹽以對抗其耗竭。
12. 投用本藥可能要限制病人鈉之攝入。
13. 單次劑量(10mL)之酸中和能力為18mEq。
14. 單次劑量(10mL)之鎂含量為14mEq。
15. 本藥與制酸劑一起服用時可能造成吸收速率與吸收程度的增加或減少，因此在服用本藥後1~2小時內勿服用其他口服藥。

【用法、用量】

一日3次，飯後1小時及睡前，或需要時服用。

年齡	劑量
成人及12歲以上	一次10mL(一包)，每日最大劑量30mL。
6歲以上未滿12歲	適用成人使用量之1/2。
3歲以上未滿6歲	適用成人使用量之1/4。
3歲以下	請洽醫師診治。

【警語】

一、 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
胃腸道	便祕、噁心、嘔吐、腹瀉、腹部痙攣、糞便有斑點或變白色(脂肪酸－鋁鹽結石)。
神經系統	(1) 心情或精神改變 (為神經毒性)。 (2) 暈眩、頭昏眼花、心跳不規則、心情或精神改變、異常疲倦或虛弱(高鎂血症或其他電解質不平衡)。
肌肉系統	腳或小腿腫脹。
骨骼系統	骨痛、腕或踝關節腫脹(為磷酸鹽之耗竭造成軟骨病和骨質疏鬆)。
其他	持續性不適感覺、食慾減失、肌肉無力或異常體重減輕(為磷酸鹽耗竭症狀)。

二、 使用本藥後，若有發生以下症狀，請立即停止使用，並接受醫師診治。

1. 若有任何不適情況發生。
2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】

60~4000毫升塑膠瓶裝，6~400包(每包10毫升)鋁箔袋裝。

【交互作用】

1. Cimetidine(抑制胃酸分泌的藥物)與本藥共用於治療十二指腸潰瘍時，可減輕疼痛，但不要同時併用，以免降低Cimetidine的吸收。
2. Dicumarol(抗凝血藥物)與本藥共用時，吸收會增加，因此須服用口服抗凝血劑時，最好選用Warfarin代替Dicumarol。
3. Digoxin(心衰竭用藥) 與本藥共用時，吸收會被抑制並降低其血漿濃度。
4. 口服抗生素(Isoniazid、Tetracycline) 與本藥共用時，吸收會被減慢和減少，應避免共用或在服用本藥至少1小時前或服用1~3小時後再使用抗生素。
5. Chlordiazepoxide或Diazepam(中樞鎮靜劑)與本藥共用時吸收速率會減慢。
6. Levodopa(巴金森氏症用藥)與含鎂制酸劑共用時吸收會增加，尤其是消化較慢的病人。
7. 口服Phenothiazines尤其是Chlorpromazine(精神症用藥)與本藥共用吸收會被抑制，應避免同時服用。
8. Calcifediol或Calcitriol(用於治療低血鈣)與含鎂制酸劑共用會造成高鈣血症。
9. 口服磷酸鉀或磷酸鈉與本藥共用時，其磷酸會被結合而阻止其吸收。
10. Sodium Polystyrene Sulfonate Resin(SPSR)(用於治療高血鉀)與含鎂制酸劑共用時，胃酸的中和作用會受損害，甚至可能造成全身性鹼中毒。
11. 大量之Aluminum Hydroxide會在上小腸處沉澱膽酸，使得脂溶性維生素A之吸收減低。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【保存條件】

本品應包裝於緊密容器，貯於25℃以下處所並避免冷凍。

榮民製藥股份有限公司
Taiwan Veterans Pharmaceutical Co., Ltd.
447 Chung Shan E. Rd., Sec. 3, Chung-Li Dist., Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.
桃園市中壢區中山東路三段447號 電話：(03)4651190