約克製藥股份有限公司
York Pharmaceutical Co., Ltd

本藥須由醫師處方使用
衛署藥製字第 021326 號

# “約克”易瀉停膠囊

Isidium Capsules “Y.K.”

腹瀉是腸之蠕動過度而引起的，本品主成分 Loperamide HCl 直接作用於腸壁，抑制腸壁之過度蠕動，而有止瀉作用，對急性、慢性腹瀉都有著效。本品對中樞神經系無任何作用，其藥效迅速而確實，本品能與抗生素、磺胺劑、固醇類及精神安定劑合用，無配合禁忌。

【成　分】Each capsule contains：

Loperamide HCl ..... 2 mg

【賦形劑】

Microcrystalline Cellulose (101), Dibasic Calcium Phosphate, Lactose, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Sodium Starch Glycolate, Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Titanium Dioxide, Brilliant Blue FCF, Tartrazine, New Coccin, Purified Water.

【適應症】

急慢性腹瀉。

【類　別】

本藥須由醫師處方使用。

【用法用量】

急性腹瀉：成人初劑量 2 粒，其後每次 1 粒，如再瀉，加服 1 粒，每天不超過 8 粒。小孩初劑量每公斤 0.08mg，其後每次每公斤 0.04mg，每日 2~3 次服用，依病況增減之。

慢性腹瀉：成人初劑量每天 2 粒，小孩初劑量每天 1 粒，分 2 次服用之，第二天後調整劑量至每天維持 1~2 次硬便為止，如有便秘情形，則須降低劑量。

**【注意事項】**

**一、一般的注意：**

**（一）服用止瀉劑是對下痢的對症療法，如有脫水症狀時，須利用輸液等方法補充水分及電解質。**

**（二）藥理上會有便秘情形出現，故應注意其用量，如有便秘等情形，須停止服用，尤其是有肛門病疾的患者宜小心給藥。**

**二、禁忌：**

**（一）服用抗生素藥物引起的偽膜性大腸炎患者。**

**（二）未成熟小兒，新生兒及未滿 6 個月的乳幼兒。**

**（三）曾對本劑發生過敏反應之患者。**

**三、下列患者原則上不要投與，但如有需要時，必須慎重投與。**

**（一）細菌性下痢患者。**

**（二）潰瘍性大腸炎患者。**

**（三）6 個月以上未滿 2 歲乳幼兒。**

**四、慎重授與：有嚴重的肝障礙者。**

**五、副作用：**

**（一）過敏症，偶有發疹，極少例有蕁麻疹，搔癢感等症狀出現，此時應止服用。**

**（二）肝臟：極少例有 GOT，GPT 及 γ- GTP 上昇情形。**

**（三）消化器官，有時會有腹部膨漲感，腹部不適，噁心、腹痛，偶而有嘔吐，食慾不振，且這些病症常伴生 ileus 症狀（嚴重便祕）。**

**（四）其他，有時會口渴、睡意、暈眩，極少例有流汗，疲倦等情形出現。**

**六、高齡患者：因其生理機能一般較低，故注意其用量小心投與。**

**七、孕婦及授乳中婦女：對孕婦及授乳中婦女，其安全性仍未確立，應衡量其利弊，慎重投與。**

**八、幼小兒：對幼小兒的安全性尚未確立，故不宜投與。如有需要時必須慎重投與。**

【包　裝】6-1000 粒 HDPE 塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

【儲　存】儲存於 30℃以下。

約克製藥股份有限公司
雲林縣斗六市榴中里復興路 3 號

電話：05-5571820
傳真：05-5571809