



# 華興製藥

抗組織胺劑


“華興” 祝敏康 錠

*Sumincon Tablets “H.S.”*

衛署藥製字第 21841 號

【成分】

每錠含 Piprinhydrinate.....3mg



N-Methylpiperidyl 4-benzhydryl ether 8-chlorotheophyllinate (C<sub>26</sub>H<sub>30</sub>ClN<sub>5</sub>O<sub>3</sub>)

【賦形劑】

Lactose、Starch、Povidone、Magnesium Stearate、Talc、Brilliant Blue FCF.

【適應症】

蕁麻疹、濕疹、皮膚炎、藥物疹、皮膚搔癢症、過敏性鼻炎、支氣管氣喘、暈動病。

【本質】

本藥係對抗由組織胺(Histamine)所引起之過敏性症狀及種種反應的藥劑。用於治療氣喘、過敏性鼻炎、蕁麻疹及藥物過敏等症，並可解除或預防乘車、船及飛機所致之噁心、嘔吐。本劑係 Diphenylpyraline 之衍生物，與通常之抗組織胺劑如 Ethylenediamine 類，Ethanolamine 類及 Propylamine 類之衍生物在結構上有所不同，本藥之抗組織胺作用強，約為 Diphenhydramine HCl 之十倍，並且少有一般抗組織胺習見之副作用，以少劑量即可發揮療效為具特點，故凡其抗組織胺服用無效時，可改用本藥治療之。

【用法用量】

通常成人每次 1 錠，一日 3 次服用之，或依年齡症狀適宜增減之。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 本藥具有嗜眠作用，故從事駕駛等伴有危險性之機械操作之患者，使用需十分注意。
2. 禁忌：有青光眼、綠內障、前列腺肥大、下泌尿道阻塞性損傷的患者、急性氣喘發作、早產兒禁用。
3. 副作用：(1)有發癢等過敏症狀時，須停止使用。  
(2)精神神經系統：偶有頭暈、倦怠感、睡意等症狀。  
(3)消化系統：偶有食慾不振症狀。
4. 孕婦或有可能懷孕之婦人及大腦皮質局部損傷的病患不宜使用。
5. 相互作用：併用中樞神經抑制劑，MAO 抑制劑（單胺氧化酶抑制劑）、抗膽鹼激能性作用藥或攝取酒精時會加強相互作用，故在這種情況下必須減量，慎重給予。

【儲存】

儲存於 25°C 以下。

【包裝】

6~1000、2000、5000 粒塑膠瓶裝。

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號

服務專線：(04)8832121~6