

**心血管栓塞事件：**

1. NSAIDs藥品會增加發生嚴重心血管栓塞事件之風險，包括心肌梗塞和中風，且可能為致命的。此風險可能發生在使用該類藥品的初期，且使用藥品的時間越長，風險越大。
2. 進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG) 之後14天內禁用本藥。

衛署藥製字第 022461 號

僂麻質斯、神經痛治療劑

“壽元”**利克痛** 注射液

Licoton Injection "S.Y."

**【成分】：**每 mL 中含：

Sodium Chondroitin sulfate.....10mg

Sodium Salicylate.....20mg

賦形劑： Sodium Bisulfite, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid,  
Water for Injection.

**【適應症】**

老人性神經痛、急慢性僂麻質斯、肋間神經痛、痛風、坐骨神經痛、婦人腰痛、後陣痛、關節痛、外傷性神經痛、肌肉痛。

**【用法用量】**

通常成人 1 次 20mL，1 日 1 次，徐徐靜脈注射（須 6 分鐘以上），本藥限由醫師使用。

**【禁忌症】**

進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG) 之後 14 天內禁用本藥。

**【警語】**

**1. 心血管栓塞事件：**

依據多項COX-2選擇性抑制劑及非選擇性NSAIDs之臨床試驗研究，發現使用該類藥品達三年，會增加嚴重心血管栓塞事件之風險，包括心肌梗塞和中風，且可能為致命的。惟依目前現有研究數據，無法證實各種NSAIDs藥品是否具有相似之心血管栓塞事件風險。且無論病人有無心血管疾病或相關危險因子，發生嚴重心血管栓塞事件之相對風險，具有相似程度的增加。但是，有心血管疾病或具相關危險因子者，因本身出現心臟病發作或中風的風險即較高，故使用該類藥品後發生嚴重心血管栓塞事件之絕對風險更高。另一些觀察性研究發現，剛開始使用該類藥品的幾周內，即可能出現嚴重心血管栓塞事件，而且隨著使用劑量增加，其心血管栓塞事件之風險亦隨之增加。

為減少該類藥品之心血管不良事件潛在風險，建議儘可能使用最短治療時間及最小有效劑量。且在用藥期間，醫療人員及病人應注意心血管不良事件之發生，即使在先前未曾出現心血管相關不良症狀。病人需要被告知嚴重心血管不良事件之症狀以及發生時之處理方式。

**2. 冠狀動脈繞道手術(CABG)後：**

兩項大型臨床試驗研究顯示，於冠狀動脈繞道手術後 10-14 天內使用 COX-2 選擇性抑制劑藥品，其發生心肌梗塞及中風的情形增加。因此，進行冠狀動脈繞道手術之後 14 天內禁用本藥。

**3. 最近發生心肌梗塞的病人：**

觀察性研究顯示，在心肌梗塞後使用 NSAIDs 藥品，在用藥第一周時，出現再梗塞、心血管相關死亡及整體死亡率等情形皆增加。研究亦顯示，心肌梗塞後使用

年。雖然使用NSAIDs者第一年後之死亡率逐年下降，但其後4年內之死亡率仍相對較高。

因此，應避免使用本藥品於最近曾發生心肌梗塞的病人，除非經評估使用藥品之效益大於再發生心血管栓塞事件之風險。若本藥品使用於近期發生心肌梗塞的病人，應嚴密監視是否出現心肌缺血之症狀。

#### 4.心臟衰竭與水腫：

隨機分派研究結果顯示，使用COX-2選擇性抑制劑及非選擇性NSAIDs藥品治療的病人發生心臟衰竭住院的比例為安慰劑組的兩倍。且在觀察性研究亦發現，有心臟衰竭的病人使用該類藥品，其心肌梗塞、因為心臟衰竭住院及死亡等情形皆增加。

有些使用NSAIDs藥品的病人被觀察到有水分滯留及水腫等情形。因此使用本藥品可能會使一些藥品之心血管作用變得不明顯，例如diuretics、ACE inhibitors或angiotensin receptor blockers(ARBs)。

因此，應避免使用本藥品於嚴重心臟衰竭的病人，除非經評估使用之效益大於心臟衰竭惡化之風險。若本藥品使用於嚴重心臟衰竭的病人，應嚴密監視是否出現心臟衰竭惡化之症狀。

#### 【注意事項】

- 1.一般應注意事項：偶有引起休克樣症狀，平時應有急救措施之準備。
- 2.禁忌：有水楊酸製劑(Aspirin)等及 Chondroitin Sulfate 製劑之藥物過敏症病歷之患者。
- 3.須慎重投藥：
  - a.腎障害患者。
  - b.Chondroitin Sulfate 製劑之使用經歷患者。
  - c.有藥物過敏症病歷之患者。
- 4.副作用：
  - a.過敏症：偶有惡感、戰慄、氣喘發作、發疹蕁麻疹、紅斑出現。
  - b.神經系：偶有冷汗、頭暈、頭痛、催眠倦怠感出現。
  - c.胃腸：偶有嘔吐等現象，此等現象出現時減量或中止用藥。
  - d.注射部位：偶有血管痛、發紅、搔癢、腫脹等現象。
  - e.血液：偶有 Prothrombin 時間之延長，血小板機能異常之現象。
  - f.其他：偶有發熱、熱感、浮腫之呈現。
- 5.相互作用：
  - a.對抗凝血劑之作用有增強，須慎重投藥。
  - b.對抗糖尿病用劑(如 Sulfonyleurea)之作用有增強，併用時，須觀察血糖值，並慎重用藥。
- 6.妊婦或有可能懷孕之婦人不可使用。
- 7.使用上應注意事項：使患者橫臥，10~20mL 靜注時須 3~6 分鐘以上。

#### 【包裝】

20mLx10A、20mLx50A。

壽元化學工業股份有限公司

嘉義市新民路 128 號