Edit : 29 / Dec / 2015 MU0505 Date : 6 / Aug / 2015
Size : 120 x 255mm Size : 120 x 270mm

消 化 性 潰 瘍 治 療 劑

“杏林”平 克 疾®顆粒

PECSIE® Granules “Kyorin”

ペクシー®

”PECSIE” 是由具有制酸及炎症粘膜保護雙重作用之 Gastric Mucin 所配合而成之一種消化性潰瘍治療劑。

【成 分】

本品為綠色，且具甘味之顆粒，1g 中含有下列有效成份：

Gastric Mucin..... 0.260g
Dried Aluminum Hydroxide Gel..... 0.300g
Magnesium Trisilicate..... 0.396g

有效成份之性狀如下：

(1) Gastric Mucin
本劑由豚之胃粘膜抽出，精製後之糖與蛋白之複合體，為白~黃色之粉末或橙黃色之細粒，略具鹽味及 Pepton 樣之特異臭味。

(2) Dried Aluminum Hydroxide Gel
本劑為白色無晶性粉末，無臭無味，大部份不溶於水或 Ethanol。大部分溶於稀 HCl 或 NaOH 試液。

(3) Magnesium Trisilicate
白色之微細粉末，無臭無味。殆不溶於水或 Ethanol。

【賦 形 劑】

Sodium Copper Chlorophyllin Trisodium Glycyrrhizinate

【作 用】

(1) Gastrin Mucin
1. 粘膜保護作用
投與本劑後，在胃內形成有彈力性之膠質液，促進急性胃潰瘍動物之治療改善 (Rab bit)。
2. 胃酸中和緩衝作用
中和 Histamine 刺激後之胃內游離鹽酸 (Dog) 。

(2) Dried Aluminum Hydroxide Gel
本劑對於酸中和反應速度比 Sodium Bicarbonate 或 Magnesium Oxide 要慢，但作用持續時間要長。

(3) Magnesium Trisilicate
本劑因有酸中和反應及吸著作用，故顯示有制酸作用。

(4) 急性毒性
LD_{50} 12.6g / kg 以上 (Rat 經口投與)。

【適 應 症】

緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、消化不良。

【用法用量】

通常1 次 1~1.5g ，1 天 3 次，食間服用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注 意】

1. 服用後，會產生綠色便，此乃是 Chlorophyllin 關係，並非副作用。
2. 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析性骨軟化症 (Dialysis Osteomalacia) 、透析性腦病變 (Dialysis encephalopathy) 及低磷血症，應謹慎小心使用。

【包 裝】

1g x 100p、1g x 1000p 盒裝
500g 1kg 罐裝

衛署藥製字第022861號

日本杏林製藥株式会社 授權
杏林新生製藥股份有限公司 製造
桃園市龍潭區三和里店湖一路237號
電 話：(03) 470-3248 · 470-3249

MU0505