尺寸：10.5x32cm

外用

利膚外傷軟膏

B.&N. BACINEOCIN OINTMENT

【特色】
本藥是一種外用廣效抗生素，對於多種格蘭氏陽性菌、格蘭氏陰性菌有抑菌、殺菌作用。

【成分】有效成分及含量：
每公克含
Neomycin Sulfate.....5mg(eq to 3.5mg potency)
Bacitracin Zinc.....12.5mg(eq to 500 units)
其他成分(賦形劑)：White Petrolatum、Liquid Paraffin。

【用途(適應症)】
緊急處理、預防因皮膚外傷(如刀傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨傷、輕微燙傷)造成的感染或減緩傷口的感染。

【使用上注意事項】
一.有下列情形者，請勿使用：
1.曾因本藥成分引起過敏。
二.有下列情形者，請洽醫師診治：
1.3歲以下。
2.有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
三.有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1.兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
四.其他使用上注意事項：
1.為防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射。
3.勿超過建議使用量或使用次數。
4.使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
5.使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
6.本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
7.請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
8.本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
9.使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

【用法用量】

每日1-3 次	局部清潔後，適量均勻塗抹於患部，需要時得以滅菌紗布或繃帶覆蓋

【警語】
一.使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹等過敏性皮膚炎
耳朵	耳毒性
腎臟	腎毒性

二.使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1.若有上述外之其他不適情況產生。
2.使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】100公克以下鋁軟管、塑膠罐裝，450公克塑膠罐裝。
【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。
【儲存方式】本品應存放於25℃以下，避光保存。
衛署藥製字第022990號

西德有機化學藥品股份有限公司
新北市三重區中正北路560巷36號

IP03e