

“信東”
安謀黴素 膠囊 250 毫克
Amoxicillin Capsules 250mg

本藥是一種類似安比西林(Ampicillin)而比安比西林更廣效之半合成抗生素。對於革蘭氏陽性菌與革蘭氏陰性菌有強力的直接殺菌作用，經口投與吸收後所產生的血中濃度約為 Ampicillin 的 2 倍，於組織中穿透力強，膿性痰、粘液痰中也能移行，膽汁中濃度高。本藥在體內代謝少，很少與血清蛋白結合。於動物實驗結果，對病原菌感染有防禦效果，為 Ampicillin 的 2 倍以上，且毒性小，耐力高，吸收亦不受飯食影響。


[組成]

主成分：每粒膠囊中含有：

Amoxicillin Trihydrate..... 250mg(Potency力價)

賦形劑：Sodium Lauryl Sulfate、Magnesium Stearate、Talc、Capsule Shell (含 Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine、Sunset Yellow FCF)。

結構式：6-[D(—)- α -amino- α -(p-hydroxyphenyl)acetamido]Penicillanic acid Trihydrate。



[適應症]

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

- 1.呼吸道感染：支氣管炎、肺炎、咽頭炎、扁桃腺炎。
- 2.膽道感染症：膽管炎、膽囊炎。
- 3.尿道感染症：腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎。
- 4.生殖器感染：淋病、前列腺炎、副睪丸炎、子宮附屬器炎、子宮內膜炎、骨盤腹膜炎。
- 5.皮膚及軟組織感染：毛囊炎、膿皮症、膿瘍、疖、癰、痤瘡、膿瘍、蜂窩組織炎、壞疽、褥瘡、乳腺炎、淋巴節炎。
- 6.眼瞼炎、淚囊炎、麥粒腫、中耳炎、耳癆、鼻癆、齒槽膿瘍、頸炎。
- 7.骨膜炎、骨髓炎、猩紅熱、敗血症、細菌性心內膜炎。
- 8.創傷及手術後二次感染。

[用法・用量]

成人：一次口服 250mg，一日 3~4 次。

小孩：依體重每日 20mg~40mg/kg，分 3~4 次服用。

病情嚴重時，可酌予增量服用。

本藥須由醫師處方使用。

[注意事項]

- 1.對青黴素過敏者，不宜使用本藥。
- 2.服用本藥如有眩暈、噁心、嘔吐、耳鳴、口內異常感等現象，應予停藥。
- 3.關於妊娠期投與之安全性，尚未確立，使用應慎重注意。

[保存條件]

儲存於室溫、緊密容器。

[包裝]

6~1,000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 023264 號

委託者：信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路22號
製造廠：榮民製藥股份有限公司
桃園市中壢區中山東路三段447號

40410071③