

綜合氨基酸維他命醇醣電解質點滴注射液

“南光” 安命活源 注射液

Aminogen-X Injection "N.K."

□成分：

	gm/ℓ	m.mol/ℓ	Cal./ℓ		gm/ℓ	m.mol/ℓ	Cal./ℓ
必須氨基酸	安命活源液總熱量卡	—	300	電解質	Na ⁺ (Sodium hydroxide)	1.6	40
	L-Isoleucine	0.8	—		K ⁺ (Potassium hydroxide)	1.68	30
	L-Leucine	1.1	—		Mg ⁺⁺ > (Mag-Acetate 4H ₂ O)	1.07	5
	L-Lysine	1.0	—		Acetate	—	10
	L-Methionine	1.05	—		malate ⁻ (malic acid)	3.0	22.5
	L-Phenylalanine	1.1	—		Cl ⁻ (Lysine HCl+Pyridoxine HCl)	7	—
	L-Threonine	0.5	—		Sorbitol	25	—
	L-Tryptophan	0.25	—		Xylitol	25	—
	L-Valine	0.75	—		Ascorbic acid	0.4	—
	L-Arginine	2.0	—		Riboflavin Sodium Phosphate	0.0025	—
	L-Histidine	0.5	—		Inositol	0.5	—
	Glycine	5.0	—		Nicotinamide	0.06	—
	L-Alanine	3.0	—		Pyridoxine HCl	0.04	—
	L-Glutamic acid	4.5	—				
	L-Proline	3.5	—				

□賦形劑：Sodium Bisulfite、Edta disodium Salt、Monothioglycerol、pH值調整劑
、Water for injection。

□作用特點：

1. 安命活源注射液內含有八種必須氨基酸與六種非必須氨基酸，均為純粹結晶之精製品，絕不含有任何夾雜物，故其營養價值極高，在體內吸收迅速，利用率極大，蛋白合成作用甚高，耐受性極佳。
2. 安命活源注射液含有二種醇醣(Sorbitol與Xylitol)，較葡萄糖為佳，可供給身體所需熱量，提高氨基酸的利用率，促進組織蛋白的合成，改善中間代謝，並增強解毒機能。
3. 安命活源注射液含有維他命，促進代謝所需輔酵素，可提高電解質與氨基酸的利用率。
4. 安命活源注射液提供了電解質，因此對於電解質失調者有很大助益。
5. 安命活源注射液1000 ml可供給300卡的熱量。

□適應症：

電解質失調、維他命缺乏、蛋白質缺乏等營養不良症狀。

□用法用量：本藥限由醫師使用。

安命活源以滅菌無熱原的點滴器靜脈點滴注射之，成人一日以1000 ml為宜，但必要時可以酌以增加至2000 ml，點滴時速度宜緩慢，每小時以250 ml為宜。

□注意事項：

1. 本品應用滅菌消毒安全的點滴器使用，本品經打開或注入空氣針後要立即使用，放置後即不再使用，用畢應全部丟棄。
2. 腎病性循環不良，嚴重性肝實質損壞，血氮過高症時和其他同類的點滴液一樣均不適用。
3. 發現本注射液在使用前成不真空狀態或其他原因以致有沈澱或異物時不得使用，請另改他瓶使用之。
4. 本品不適合將任何藥品，血液等加入本品中輸注使用；若必須混合使用時，必須向廠商洽詢其配伍禁忌、與藥品間相容性問題。
5. 使用方法

(1)取用時：

- a. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。
- b. 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

(2)輸液套選用及插入法：

- a. 請依輸液套使用方法正確使用。
- b. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。
- c. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

□儲 藏：本品應於25°C以下儲存。

□包 裝：250、500、1000毫升玻璃瓶裝及塑膠軟袋裝。

衛署藥製字第 023312 號



南光化學製藥股份有限公司

台灣・臺南市新化區中山路1001號

TEL:886-6-5984121(代表) FAX:886-6-5981845