過敏性疾患治療劑

"佛記"安樂敏糖衣錠

Allermin S.C. Tablets "FOR - CHI"

【成分】每粒糖衣錠含有：

有效成分及含量：

Chlorpheniramine Maleate　5mg、Riboflavin　5mg、Pyridoxine Hydrochloride　5mg、Biotin　0.25mg、Nicotinamide　10mg、Calcium Pantothenate　20mg、Glycyrrhizine　12.5mg

其他成分(賦形劑)：Lactose Monohydrate、Shellac、Synthetic Aluminum Silicate、Castor Oil、Carboxymethyl Cellulose Calcium、Gelatin、Microcrystalline Cellulose、Magnesium Stearate、Talc、Eudragit E100、PVP 630、HPMC、Sunset Yellow FCF、Tartrazine、Sucrose、Calcium Phosphate Dibasic。

【用途(適應症)】緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀（流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

【使用上注意事項】

●有下列情形者，請勿使用：

1.曾因本藥成分引起過敏的人。

●有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1.3 歲以下。

2.嚴重代謝性肝腎疾病的人。

3.曾有心臟或腎臟疾病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進的人。

4.有呼吸疾病的人(如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難)、青光眼或因前列腺肥大引起排尿困難的人。

●有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1.孕婦、可能懷孕婦女、哺乳婦女。

2.老年人(65 歲以上)。

3.服用鎮靜藥或安眠藥的人。

4.服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等的人。

●其他使用上注意事項：

1.為防止兒童誤食請妥善保管。

2.避免陽光直射。

3.勿超過建議使用量。

4.服用本藥期間不能喝含酒精的飲料。

5.服用本藥後，可能會嗜睡，請勿駕車或操作危險器械。

【用法用量】

年齡	每日使用次數
成人	通常一次一錠，一日 2-3 次服用
孩童	依年齡症狀適量酌減

【警語】

服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
神經系統	想睡、覺得很累、可能會覺得較平常興奮(尤其是幼兒及老年人)
口腔	口乾
眼睛	可能出現視力變差、視線變狹窄、視覺顏色異常等症狀

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1.連續服用本藥數日後，症狀仍沒有改善。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【包裝】6 -1000 粒瓶裝、鋁箔盒裝。

【貯存】貯存於 25℃以下，避光處。

【說明】本製劑係採用抗組織胺劑 Chlorpheniramine Maleate 並添加 Glycyrrhizine 及維生素 Riboflavin、Pyridoxine HCl、Biotin 等製成之抗過敏製劑。

衛署藥製字第 023507 號

PIC/S GMP

正和製藥股份有限公司新營廠

台南市新營區新工路 23 號(新營工業區)