衛署藥製字第023729號

"瑞士"

快得健® 乳膏
Quadrigen® Cream "Swiss

本品是一種廣致的外用皮膚製劑，由四種不同藥理作用之藥品調配精製而成。具有極佳的抗炎、止癢、殺菌和殺黴活性，用以治療各種皮膚疾患。尤其是因細菌或念珠菌感染，所引起之發炎性皮膚損傷，能夠發揮迅速可靠之卓越療效。

【效　能】

本品用來治療各種濕疹和其它過敏和發炎性皮膚病、續發性細菌或黴菌（念珠菌）感染。包括腹股溝皮膚病、四肢慢性皮膚病、紅癬、帶狀疱疹、濕疹樣皮膚炎、接觸性皮膚炎、細菌性皮膚炎、毛囊皮膚炎、汗疱、不全角化、甲溝炎、皮膚搔癢症、溢脂性濕疹、對磨疹、溢脂性皮膚炎、膿疱性痤瘡、膿疱症、神經性皮膚炎、枕骨帶狀疱疹、對光敏感性皮膚炎、苔癬化腹股溝皮癬菌病和黴菌感染如足癬、股癬、體癬。

【成　分】

有效成分及含量：

Each gm contains:

Betamethasone 17-valerate eq. to Betamethasone ..... 0.5 mg
Gentamycin sulfate ..... 1.0 mg（potency）
Tolnaftate ..... 10.0 mg
Iodochlorhydroxyquin ..... 10.0 mg

其他成分(賦形劑)：

Vaselin、Cetyl Alcohol、Cetomacrogol、Edetate Disodium、Chlorocresol、Polyethylene Glycol 400 Monostearate

【用途(適應症)】

治療濕疹、過敏以及細菌或黴菌感染、發炎性皮膚病。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
(一)曾因本藥成分引起過敏的人。
(二)皮膚結核、急性單純皰疹、天花、水痘。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(一)深部皮膚組織感染。
(二)3歲以下。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二)正在接受醫師治療。
(三)患部在臉上。
(四)患部化膿。

四、其他使用上注意事項：
(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
(二)避免陽光直射。
(三)勿超過建議使用量或使用次數。
(四)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
(五)本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
(六)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
(七)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

(八)一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。

(九)癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

(十)使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

(十一)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

(十二)皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

(十三)小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。

(十四)臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

【用法用量】

每天2至3次，塗於患部。

【警　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	過敏性皮膚炎、繼發性感染、局部皮膚刺激及灼熱感：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張。
全身性	庫欣式症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等）。繼發性腎上腺功能不足（如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便祕或腹瀉等）。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有上述外之其他不適情況產生。

(二)自覺狀況沒有改善或更惡化。

(三)一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使若症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

【包　裝】

1000公克以下管裝、罐裝、鋁軟管裝。

【類　別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】

請儲存於25℃以下。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號

Ⓖ