

愛默士黴素 乾粉注射劑（安莫西林）

衛署藥製字第023915號

AMOX POWDER FOR INJECTION

愛默士黴素注射劑為抗菌力強、抗菌範圍廣之一種半合成青黴素，對於細菌感染之治療，可獲得極好的效果。

成 分：

Amoxicillin (as sodium salt) 500mg (力價)

Amoxicillin (as sodium salt) 1.0gm (力價)

特 點：

- 1.本品具有強力、迅速之直接殺菌作用，耐受性極佳，而且使用安全，極少有不良之副作用。
- 2.抗菌範圍廣及革蘭氏陽性及陰性菌，特別是鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、炭疽桿菌、梭狀桿菌、淋病雙球菌、腦膜炎球菌、沙門氏菌、志賀氏菌、大腸桿菌、百日核嗜血桿菌。
- 3.本品注射後，在血、尿、膽汁及細胞組織中迅即達最高濃度，其有效治療濃度可維持12小時以上。
- 4.本品係經膽道及生殖泌尿道排出體外，故對膽道及生殖泌尿道之感染症（如淋病、梅毒、尿道炎等）能發揮最大療效。

作 用：

上呼吸道感染：扁桃腺炎、喉頭炎、竇炎、咽炎、中耳炎。

呼吸道感染：急性及慢性支氣管炎、支氣管擴張、肺炎。

生殖泌尿道感染：膀胱炎、腎盂炎、尿道炎、陰道炎、前列腺炎、子宮內膜炎、淋病、梅毒。

胃腸道感染：急性腸胃炎、腸炎、痢疾、傷寒。

肝膽道感染：肝膿瘍、膽囊炎、膽管炎。

其他：皮膚及皮下組織感染、腦膜炎、乳腺炎、腹膜炎、胸腺炎等。

適 應 症：

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他有感受性細菌引起之感染症。

用法用量：

本品可肌內注射或溶於生理鹽水中緩慢靜脈注射或輸注。本品限由醫師使用。

成人：每次注射250~500mg，一日三次。

5~25公斤兒童：每日劑量為每公斤體重給予25~50mg，等分成二~四次，每6~12小時注射一次。

5公斤以下嬰兒：每日劑量為200mg，等分成四次注射。

注意事項：

- 1.使用前應作皮下試驗，凡有過敏或曾對青黴素過敏者，不得使用本品。
- 2.長期治療時，應定期作肝、腎及造血機能之檢查。
- 3.治療期間應注意黴菌或細菌之過度繁殖，如有發生應即停藥或改用其他適當之治療。
- 4.孕婦安全性尚未建立，孕婦及授乳者避免使用。

包 裝：

每小瓶500公絲、1公克，100支以下盒裝。

委託者：意欣國際有限公司

地址：高雄市三民區懷安街119號

製造廠：政德製藥股份有限公司

地址：雲林縣大埤鄉豐田工業區豐田路2號