

“景德”

愛斯得 膠囊250公絲 (紅絲菌素硬脂酸鹽)

ERYSTAC Capsules 250mg (Erythromycin stearate)

"Kingdom"

Erythromycin stearate是從Streptomyces erythraeus菌製成，對革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌、螺旋體屬、立克次體屬、大型病毒具有甚強之抗菌作用。其主要抗菌作用為抑制細菌體內蛋白質之合成。

本產品僅用於口服，以空腹時服用尤佳，因可被迅速而完全吸收，且其副作用較小。

【主成分】

成人：通常每6小時服用250mg
孩童：通常30-50mg/kg/day，分四次服用。
原發性梅毒：一天4次，每次250mg，連用15天以上。
淋病：一天4次，每次500mg，連用5天以上。
空腹時服用。
本藥須由醫師處方使用。

【效能】

金黃色葡萄球菌引起之感染症、肺炎雙球菌引起之上、下呼吸道感染症、Mycoplasma肺炎菌引起之原發異形肺炎、流行性感冒桿菌、梅毒螺旋體及奈瑟氏淋菌引起之原發性梅毒或淋病、尤其對青黴素有過敏反應之塵時，本品為理想之代用藥物。

【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

【用法用量】

成人：通常每6小時服用250mg
孩童：通常30-50mg/kg/day，分四次服用。

原發性梅毒：一天4次，每次250mg，連用15天以上。

淋病：一天4次，每次500mg，連用5天以上。

空腹時服用。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.孕婦使用之安全資料尚未建立，避免服用為宜。
- 2.肝臟功能不良之患者，禁忌使用。
- 3.本品可能升高theophylline在血中之濃度，使其毒性增加，故二者併用時須降低theophylline之劑量。
- 4.使用本品最常見之副作用為胃腸痙攣、不適，此外亦偶有噁心、嘔吐、下痢等現象。
- 5.使用本品有過敏症狀如皮膚發紅、發疹時，應即停藥。

【賦形劑】

Sodium Citrate、Magnesium Stearate

【膠囊殼成分】

Gelatin、Purified Water、Sodium Lauryl Sulfate、New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine、Sunset Yellow FCF

【儲存】

請保存於乾燥陰涼處（15°C-30°C）。

【包裝】

1000顆瓶裝。

衛署藥製字第025020號

委託者：景德製藥股份有限公司

台北市中山北路二段113號8樓

製造廠：榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路三段447號

40417080 ②