# “應元”普利泄 注射液 0.5 公絲（布米他奈）

## Bunisex Injection 0.5mg “Y.Y.” (Bumetanide)

【成分】：每 ml 含有

Bumetanide ..... 0.5mg

賦形劑：

Sodium chloride，Sodium Bicarbonate，Benzyl Alcohol，Water for Injection。

【性質】：

本品可經由肌肉注射或靜脈注射或靜脈輸注，靜脈輸注後幾分鐘即開始作用，大約二小時作用消失。本品之利尿作用與劑量多寡有關。某些病人使用低劑量不會發生反應，但對高劑量則有反應。

本品必瑞主要作用於亨利氏蹄的上升支，於近曲尿管亦有作用。

【適應症】：

水腫、利尿。

【用法用量】：

一般 1-2mg。靜脈或肌肉注射。

肺水腫：最初靜脈注射 2mg，若有需要 20 分鐘後再重覆注射。

下列情況宜靜脈輸注：2-5 的本品於 500mg 的輸注液裡，輸注 30-60 分鐘。

腎衰竭：2-10mg 於 500ml 的輸注液裡，輸注 30-60 分鐘，若有需要 6-8 小時間隔再重覆注射。

水楊酸與巴比妥酸鹽中毒之病人：開始靜注 2mg，接著每 4 小時注射 1mg，於 24 小時內共注射 7mg。

本品可加入葡萄糖、氯化鈉、氯化鉀、重碳酸鈉輸注液裡一起注射。肌肉注射，初劑量是 1mg，然後依病人利尿反應而調整劑量。

本藥限由醫師使用

【禁忌症】：

任何顯著的增加血尿素或尿少症或嚴重進行性腎疾病病人於治療期間發生無尿症應停止使用。

肝昏迷病人應禁用，嚴重電解質缺乏病人應特別注意。

因本品可減少鋰之清除力而導致高鋰血清濃度，故不可與鋰鹽一起給藥。

【注意事項】：

本品與其他利尿劑一樣，會引起電解質障礙。肝硬化和服用 digitalis 的病人應特別注意低鉀血症之發生。故需定期控制病人之血清電解質。糖尿病和疑有潛在性糖尿病人亦應定期控制尿和血糖，本品可加強抗高血壓藥物之作用。

孕婦：雖然於動物尚未發現致其畸形之作用，懷孕首三個月仍應避免使用。

【副作用】：

副作用少，長期使用可能會引起電解質平衡之改變而形成低鉀血症和低氯鹼血症。此種情形下可補充氯化鉀。某些病人被發現有無微狀的高尿酸血症。嚴重慢性腎功能衰竭病人之加強治療可能引起肌肉痙攣或疼痛，一旦停藥即可消失。極少數病例有皮膚疹、顆粒性白血球缺症、血小板減少及腹部不適之報告。耳毒性非常少見。

【過量之處理】

恢復血液溶積，維持血壓和改正電解質障礙。

【包裝】：

1 毫升、4 毫升，100 支以下安瓿盒裝。

應元化學製藥股份有限公司
台灣台南市安平工業區新忠路 26 號 TEL：(06) 2654883（代表號）