

“紐約”特蒂樂乳膏 0.1%(瑞婷羅)

TRETINOIN CREAM 0.1%

衛署藥製字第025237號

本品主成分為(3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-all-trans-tetraenoic acid)為一種剝皮劑，塗抹以後能使表皮角質層易於剝離，並能促進表皮細胞分裂活動趨於正常。雖然維他命A酸的真正作用仍不明瞭，但現有證據指出，局部使用維他命A酸可減少濾泡上皮細胞的內聚力及減少微小粉刺的形成。除此之外，維他命A酸亦可刺激絲狀分裂的活性增加濾泡上皮細胞的轉換，把粉刺擠出。維他命A酸於治療尋常性痤瘡只能局部使用。

成分：每公克含

Tretinoin.....1.0mg

賦形劑：Cetylstearyl alcohol、Cetomacrogol、Ethoxydiglycol、Butylated hydroxytoluene、Antifoam A、Mineral oil、Chloro-m-cresol、Sodium phosphate monobasic dihydrate、Eddate disodium、White petrolatum、Phosphoric acid、Purified water

適應症：

尋常性痤瘡(面皰)丘疹。

副作用：

- 1.皮膚如發生過敏現象，可能有泛紅、水腫、水疱或痂皮等症狀，假如有這些現象發生時應暫停使用，直到皮膚恢復完整或降低使用頻率直到病人可忍受再繼續治療，事實上局部使用維他命A酸發生過敏現象是非常少的。
- 2.重覆使用時可能會發生暫時性的過度或過少色素沈著。
- 3.過量使用並不會加速或提高治療效果，皮膚還可能發生紅斑、脫皮及不適等症狀。
- 4.對本品過敏者，禁止使用。

注意事項：

- 1.須置於小孩接觸不到之處。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 5.除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
- 6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 10.深部皮膚組織感染請就醫治療。
- 11.剛開始使用本品幾個星期內可能有暫時性情況加劇之現象，可減輕用量，約2~3個星期即可見療效，請繼續使用3~4個月即會有佳效。
- 12.由於本品會助長皮膚對紫外光之過敏反應，故日晒後避免隨即使用本品，同時使用後避免日晒。
- 13.本品會刺激黏膜，使用時勿觸及口、鼻、眼睛等處。
- 14.皮膚濕疹患者勿用，以免發生嚴重之刺激。
- 15.避免同時使用其他剝皮劑如水楊酸、硫、雷瑣辛(Resorcinol)、Benzoyl Peroxide等。
- 16.避免過度使用肥皂、化粧品、收斂劑等。

用法用量：

一天1~2次，使用前先把患部用肥皂把皮膚表面的油脂洗掉，並用清水沖洗乾淨，等乾燥15~20分後再塗抹。醫師藥師藥劑生指示藥品。

包裝：1000公克以下瓶裝、管裝。



人人化學製藥股份有限公司中壢廠
桃園市中壢區南園二路3號