“優良”葡萄糖鈣注射液
CLUCAL INJECTION

“優良”葡萄糖鈣注射液(Glucal Injection)，每 ml 內含 Gluco-Calcium 相當於 18.0mg 之鈣質，並以 0.25%Phenol 爲防腐劑。

成 份:

Each ml contains:
Dextrose……..220.5mg
Calcium hydroxide……33.3mg

作 用:

鈣是人體內第五豐富之元素，大部份貯存於骨骼內。鈣在生理方面具有重要的作用，主要是調節神經與肌肉系統功能之完整，爲正常的心臟功能所必需，同時也是血液凝固的因素之一。

適應症:

低鈣血症所引起的症狀，如新生兒手足搐弱症(Neonatal Tetany)，由於副甲狀腺素不足，維他命 D 缺乏症，鹼中毒等所引起的手足搐弱症。

用法用量:

“優良”葡萄糖鈣注射液(Glucal Injection)用於肌肉注射之劑量爲 2-5ml。對年幼病患在緊急情況下而靜脈注射又困難時，若用 5ml 時要注射在臀部或嬰兒的兩股外側。

“優良”葡萄糖鈣注射液(Glucal Injection)靜脈注射之常用劑量爲 5-20ml，應遵守靜脈注射之一般注意事項，注射液應先加熱至體溫再緩慢注射到(1 分鐘 2ml)。倘若病人有任何不適現象，則須停止注射俟不適反應消失後再行繼續。注射後病人宜靜臥休息片刻，由於鈣的快速排出，有時需要重複注射。

當新生兒每換血 100ml 後，其常用注射劑量爲 0.5ml。

本藥限由醫師使用

警 告:

因鈣質的附加作用，所以對使用毛地黃療法或曾以有效量毛地黃素或類毛地黃製劑治療中之患者，施用時應特別小心。

雖然“優良”葡萄糖鈣注射液(Glucal Injection)以肌肉注射後顯示有良好的耐受性，但僅對年幼病患在緊急情況下而靜脈注射又困難時始可施用。

副作用:

肌肉注射後會產生輕微局部反應;但尚無嚴重發炎反應的報告。快速的靜脈注射常會引起病人的不快感，如刺痛、鈣味，壓迫感或”熱燥”的感覺等。

賦形劑:

Liquefied Phenol
Oxalic Acid, Reagent
Water for Injection

包裝:

5mlx10 安瓿，5ml 小瓶裝，30ml 小瓶裝。　　衛署藥製字第 025404 號

委 託 者: 優 良 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 司
地　　址: 臺北市內湖區內湖路一段 392 號 11 樓之 1
製 造 廠 : 瑞 士 藥 廠 股 份 有 限 公 司 新 市 廠
地　　址 : 臺 南 市 新 市 區 中 山 路 1 8 2 號