GMP 藥品　　衛署藥製字第 025817 號

"派頓"惠肌腱膠囊(匹洛卡)
Goodgen Capsules(Piroxicam) "Patron"

【作用】:

本劑是非 Steroid 性，非 Pyrazole 系抗炎劑，用時具有優良的鎮痛和退熱作用，臨床研究證實，此藥對由外傷外科手術，生產手術等不同原因引起的疼痛都有效，止痛效果在服用之後迅速產生。

本劑經口服之後很容易吸收，禁食狀態亦不影響吸收程度和吸收速度，每天服用一次即可在全天中保持穩定的血漿中濃度，以後長期服用，此濃度也不再增加。在體內代謝亦很徹底，每天不到 5%的劑量，以原形由糞尿中排出。人體內研究顯示，患者同時與阿司匹林使用，並不影響各藥在血液中的有效濃度，此與其他非 Storoid 性抗炎劑不同。

【成　　分】: Each capsule containe: Piroxicam 10mg

【賦 形 劑】: Magnesium stearate, Lactose.

#2 Red-Light blue No.Patron 202 Capsules：Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Purified Water, Brilliant Blue FCF, Titanum Oxide,Tartrazine, New Coocin, Erythrosine.

【適 應 症】: 類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)、僵直性、脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷和急性痛風。

【用法用量】:

1. 類風濕性關節炎、骨關節炎、僵直性脊椎炎：
   初劑量，可用每天 20mg 用一次。大多數病人的維持量，也是每天 20mg，有些病人的維持量是每天 30mg 分成一次或幾次使用，少數病人的維持量，可以減少到每天 10mg，長期服用每天 30mg 以上的劑量，會增高胃腸副作用發生可能性。
2. 急性肌肉骨骼損傷：
   最初兩天給予每日 40mg 分一次或數次服用，然後每天服用 20mg，全部治療期間是七到十四天。
3. 急性痛風：
   最初每天一次 40mg，然後每天給予 40mg，持續 4 到 6 天每天分成一次或數次服用，痛風病人不能長期服用。

【類　　別】: 本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】:

禁忌症：從前已對此藥過敏的患者，不能再使用。

1. 警告

對孕婦：雖然動物實驗沒有顯示此藥有促成畸胎的作用，但孕婦，授乳婦使用此藥是否安全，仍不確定。此藥作用於前列腺素合成酶，所以會抑制前列腺素的合成和分泌。其他非類固醇抗炎劑的此類作用已知與吃此類藥的懷孕動物的難產與延遲分娩有關。

對兒童：兒童在何種性況下可服用此藥，其劑量如何等等問題均未確定。

2. 注意事項：

服用此藥有時會引起消化性潰瘍或胃腸出血。從前已有胃腸病的人服用此藥時要特別注意。

少數病人在服用非類固醇抗炎劑(包括此藥)時，會有血中尿素氮增加的現象。使用此藥時，這種增加會止於一定的限度。停止服藥就會恢復正常。血中尿素氮的增加和血清肌酸量的增加無關。

3. 不良反應

一般說來，服用此藥沒什麼不舒服，胃腸症狀是最常見的副作用，但大致不會影響治療，根據對胃腸黏膜外表及腸中血量損失的研究，每天服用 20 公絲(分成一次或多次服用)的惠肌腱 Goodgen 胃腸所受的刺激比吃阿司匹林還小。

長期每天服用 30 公絲以上的惠肌腱，比較容易發生胃腸方面的副作用。

除了胃腸症狀以外，少數病人會出現水腫，尤其是踝部水腫。一般常規檢眼鏡檢查和隙燈檢查，都不能發現病人眼睛有什麼變化。

有人曾經發生肝機能的變化，大多數非類固醇抗炎劑包括惠肌腱(Goodgen)都會使一部份病人的血清轉胺基酶量(SGPT)增加。

4. 過量：

服用過量的惠肌腱(Goodgen)時可對病人使用支持及對症療法。

【包　　裝】: 100 粒盒裝、100、200、500、1000 粒瓶裝。

臺灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄市岡山區為隨東路 50 號
TEL:07-6216126