

氣道粘液溶解劑

"南光"祛痰能顆粒 20 公絲/公克(乙基希賜典)

CYSTENON granules 20mg/Gm "N.K." (Acetylcysteine)

衛署藥製字第 025948 號

本品為氣道粘液溶化劑，可使粘性蛋白之雙硫鍵破壞，而使濃稠的粘液水質化。具對損傷之氣管粘膜有再生和賦活作用。故對氣候性慢性支氣管炎、空氣污染過敏、病原菌及其他濾過性病毒等種種因素所引起之呼吸感染病理化的支氣管炎均能顯著的達到改善祛痰症狀。

「組成」：每 Gm 中含

Acetylcysteine 20mg

「作用」：

1. 類粘蛋白分解作用，使喀痰粘度降低，其 S-H 基能將粘稠蛋白之 -S-S- 結合裂開，迅速的使喀痰的粘度降低，此作用與蛋白分解酵素不同，對膿性及非膿性粘液分泌物有迅速和強力液化作用。

2. PH7~9 粘液溶解作用最大，有病變的支氣管內分泌物之 PH 為傾鹼性。

3. 對粘膜不會刺激或損傷，此成分為一種天然氨基酸之誘導體。

「適應症」：

減少呼吸道粘膜分泌的粘稠性。

「用法用量」：

成人一次 10gm, 每日二次，小孩 1 次 5gm, 依照年齡而

定，每日 2~4 次，急性病症治療時間，約需 5~10 天，慢性病症方面，則需由醫師方面決定延長。

服用時可直接含於口中溶化吞服或可溶於半杯清水或其他液體內服用，本藥須由醫師處方使用。

「注意事項」：

1. 本劑適當的服用可能產生支氣管分泌物的增加，當咳嗽不順暢在必要時須利用機械吸附使通氣的方法，保持咳嗽舒暢若身體不適或局部積蓄分泌物，使機械吸附器阻塞時，必須使用氣管內膜的吸附術和支氣管鏡檢法。

2. 有氣喘的患者使用本劑應特別小心，若有支氣管痙攣病情時，必須停止用藥。高齡者慎重投與。

3. 副作用：有口炎、噁心、鼻溢、惡寒、發疹但產生具感受性和敏感作用現象很少。

少數易感性病人，特別是氣喘者，使用本劑有支氣管痙攣發生。

「包裝」：

100gm, 500gm, 1000gm/Bottle, 5gm/ 鋁箔裝。



南光化學製藥股份有限公司
台灣 台南縣新化鎮中山路1001號
TEL:06-5984121(代表) FAX:
06-5972033