

康必好注射劑

Conbihol Injection “LITA”

【成分】 每 ml 含

主成分：Sodium Chondroitin Sulfate-----10mg
 Sodium Salicylate-----20mg
 賦形劑：Edetate Disodium (Eq To Disodium Edetate) (Eq To E.D.T.A.Disodium)
 (Eq To EDTA-2Na)
 Sodium Bicarbonate(Eq To Sodium Hydrogen Carbonate)(for pH adjustment)
 Water For Injection

【特徵】

- 1.Chondroitin Sulfate 是一種 Mucopolysaccharide 為軟骨組織膠原纖維、彈力纖維及細胞基質的主要構成分。與腦下垂體及副腺機能有很密切關係，所以由內分泌系統不平衡所引起之膠原病，如風濕症、關節炎、神經痛、肌肉痛、痛風等均有療效。
- 2.Chondroitin Sulfate 除有上述中樞性鎮痛作用外，亦可使白血球之噬菌作用亢進而呈消炎作用，與 Sodium Salicylate 發揮協力作用。

【適應症】

神經痛、急性風濕痛、關節痛。

【用法用量】

通常成人每日一次，每次 1Amp (20ml) 行靜脈內緩慢注射，依年齡、症狀適宜增減之。
 本藥限由醫師使用。

【注意】

1. 一般的注意：希望平時有急救處置的準備，萬一有休克危險時，可馬上急救處理。
2. 禁忌：水楊酸系藥物 (Aspirin 等) 及 Chondroitin Sulfate 製劑藥物過敏症及其既往歷。
3. 慎重投與：
 - (1) 有腎障害患者。
 - (2) 有過使用 Chondroitin Sulfate 製劑的患者。
 - (3) 有過藥物過敏症的患者。
4. 副作用：
 - (1) 過敏症 - 偶有惡感、戰慄、氣喘發作、發紺、出現紅斑。
 - (2) 神經系 - 偶有冷汗、眩暈、頭痛、催眠、倦怠感出現。
 - (3) 胃腸 - 偶有食慾不振、噁心、嘔吐、胸悶、胃痛、間有使消化性潰瘍惡化、若出現上述症狀時，請減輕劑量或中止投與。
 - (4) 注射部位 - 偶有血管痛、麻痺感、發赤、發癢、腫脹發生。
 - (5) 血液 - 凝血酶元時間延長、血小板機能異常。
 - (6) 其他 - 偶有發熱、熱感、浮腫出現。
5. 相互作用：
 - (1) 會增強抗凝血劑的作用，併用時，慎重投與。
 - (2) 會增強抗糖尿病用劑 (Sulphonylurea 系劑) 的作用，併用時，需慎重、小心觀察血糖值。
6. 孕婦使用需慎重：水楊酸系製劑、動物實驗、曾有催畸形作用、子宮肌肉緊張性高的妊婦或可能懷孕的婦人需小心投與。
7. 使用上的注意事項：靜脈注射時，使患者橫臥，注射 10~20ml，需時 3~6 分以上。
8. 避光保存於 25℃ 以下。

【包裝】

20 毫升安瓶，100 支以下盒裝。

【儲存】

避光儲存於 25℃ 以下。

衛署藥製字第 026028 號

委託者：

利達製藥股份有限公司
 台中市大甲區崑山里中山路 1 段 906 號
 消費者服務專線 04-26872345
 製造廠：瑞士藥廠股份有限公司新市廠

台南市新市區中山路 182 號



利達製藥

康必好注射劑

Conbihol Injection “LITA”

【成分】 每 ml 含

主成分：Sodium Chondroitin Sulfate-----10mg
 Sodium Salicylate-----20mg
 賦形劑：Edetate Disodium (Eq To Disodium Edetate) (Eq To E.D.T.A.Disodium)
 (Eq To EDTA-2Na)
 Sodium Bicarbonate(Eq To Sodium Hydrogen Carbonate)(for pH adjustment)
 Water For Injection

【特徵】

- 1.Chondroitin Sulfate 是一種 Mucopolysaccharide 為軟骨組織膠原纖維、彈力纖維及細胞基質的主要構成分。與腦下垂體及副腺機能有很密切關係，所以由內分泌系統不平衡所引起之膠原病，如風濕症、關節炎、神經痛、肌肉痛、痛風等均有療效。
- 2.Chondroitin Sulfate 除有上述中樞性鎮痛作用外，亦可使白血球之噬菌作用亢進而呈消炎作用，與 Sodium Salicylate 發揮協力作用。

【適應症】

神經痛、急性風濕痛、關節痛。

【用法用量】

通常成人每日一次，每次 1Amp (20ml) 行靜脈內緩慢注射，依年齡、症狀適宜增減之。
 本藥限由醫師使用。

【注意】

1. 一般的注意：希望平時有急救處置的準備，萬一有休克危險時，可馬上急救處理。
2. 禁忌：水楊酸系藥物 (Aspirin 等) 及 Chondroitin Sulfate 製劑藥物過敏症及其既往歷。
3. 慎重投與：
 - (1) 有腎障害患者。
 - (2) 有過使用 Chondroitin Sulfate 製劑的患者。
 - (3) 有過藥物過敏症的患者。
4. 副作用：
 - (1) 過敏症 - 偶有惡感、戰慄、氣喘發作、發紺、出現紅斑。
 - (2) 神經系 - 偶有冷汗、眩暈、頭痛、催眠、倦怠感出現。
 - (3) 胃腸 - 偶有食慾不振、噁心、嘔吐、胸悶、胃痛、間有使消化性潰瘍惡化、若出現上述症狀時，請減輕劑量或中止投與。
 - (4) 注射部位 - 偶有血管痛、麻痺感、發赤、發癢、腫脹發生。
 - (5) 血液 - 凝血酶元時間延長、血小板機能異常。
 - (6) 其他 - 偶有發熱、熱感、浮腫出現。
5. 相互作用：
 - (1) 會增強抗凝血劑的作用，併用時，慎重投與。
 - (2) 會增強抗糖尿病用劑 (Sulphonylurea 系劑) 的作用，併用時，需慎重、小心觀察血糖值。
6. 孕婦使用需慎重：水楊酸系製劑、動物實驗、曾有催畸形作用、子宮肌肉緊張性高的妊婦或可能懷孕的婦人需小心投與。
7. 使用上的注意事項：靜脈注射時，使患者橫臥，注射 10~20ml，需時 3~6 分以上。
8. 避光保存於 25℃ 以下。

【包裝】

20 毫升安瓶，100 支以下盒裝。

【儲存】

避光儲存於 25℃ 以下。

衛署藥製字第 026028 號

委託者：

利達製藥股份有限公司
 台中市大甲區崑山里中山路 1 段 906 號
 消費者服務專線 04-26872345
 製造廠：瑞士藥廠股份有限公司新市廠

台南市新市區中山路 182 號



利達製藥