

鼻速克錠

NOSDEC TABLETS

衛署藥製字第 026120 號

【成分】：Each tablet contains

Carbinoxamine maleate.....4mg

Pseudoephedrine HCl.....60mg

賦形劑：Tabletose - Lactose、Microcrystalline Cellulose#102、Sodium Starch Glycolate、Silicon dioxide、Magnesium Stearate

【適應症】：

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)。

【用法用量】：

一日 3 至 4 次，每次間隔 4 小時以上服用。

成人每次 1 錠，12 歲以上，適用成人劑量。6 歲以上未滿 12 歲，每次 1/2 錠。3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/4 錠。

3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】

1. 服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)。
2. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。
5. 老年人應小心使用本藥，3 歲以下不建議使用。
6. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。
7. 服用本藥不得與酒精性飲料合用。
8. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
9. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
10. 連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。
11. 不得與其它含有抗組織胺成份或鼻充血解除成分之內服製劑共用。(如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮量藥、鼻炎藥物或抗過敏藥劑等)。
12. 本藥含 Pseudoephedrine hydrochloride，應注意下列事項:
 - a. 除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。
 - b. 服用 Monoamine oxidase inhibitor(MAOI)其間，或停用 MAOI 兩星期內，不得服用本劑，如不了解服用之藥物是否含有 MAOI，請詢問醫師或藥師。

【包裝】：6~28 錠、鋁箔盒裝。

【儲存條件】：30°C 以下，避光儲存。



健康化學製藥股份有限公司
HEALTH CHEMICAL PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
台中市大甲區幼獅工業區幼四路 12 號
電話：04-26811733 傳真：04-26818462