說明書107x185mm/105.10.17

鎮暈鎮吐劑

衛署藥製字第026445號

“大豐” 安暈吐 注射液 50毫克/毫升

Anwinto Injection 50mg/ml “T.F.”

【成 分】：Each ml contains：
Dimenhydrinate.....50mg

【賦 形 劑】：
Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Water for Injection.

【適 應 症】：下列之疾患或狀態所引起之噁心、嘔吐、眩暈、暈動病Meniere`s症候群、放射線治療、手術後噁心、嘔吐。

【用法用量】：通常成人1次1ml、1日2次肌肉內注射。
本藥限由醫師使用。

【注意事項】：

(1)一般的注意：因有催眠作用本劑投與中之患者請勿開車或操作危險性之機械。

(2)禁忌：

(a)正使用Monoamine Oxidase Inhibitor者。

(b)對Diphenylmethane系化合物(Dimenhydrinate，Meclizine HCl等)過敏者。

(3)慎重投與：

(a)小兒癲癇、甲狀腺機能亢進症或急性腎炎患者。

(b)麻醉施行前之患者。

(4)副作用：

(a)精神、神經系：嗜眠、頭痛、頭重感、手指抖動、目眩、不眠、知覺異常等症狀。

(b)過敏症：發疹、光線過敏症等症狀，出現此症狀時，停止投與。

(c)胃腸：偶而胃灼熱、胃痛等症狀出現。

(d)其他：口渴、疲勞感。

(5)相互作用：

(a)與Barbituric Acid誘導體、麻醉劑等中樞神經抑制劑併用或飲酒時，可增強其作用。

(b)會使引起第8神經腦障礙之抗生素(Streptomycin，Kanamycin等)所引起之難聽、不顯性化，應慎重投藥。

(6)目前對本品用於孕婦尚無足夠且控制良好之臨床試驗資料，雖然現有臨床試驗結果，並未顯示孕婦使用Dimenhydrinate會增加危險性，但亦不能排除其危險性，孕婦應經醫師確認需要方予投用。

(7)老年人患有嚴重心臟病者，如需服用時，應請醫師特別指示。

【包裝】：5毫升、10毫升小瓶，1毫升，50、100安瓿。

GMP藥廠

大豐製藥股份有限公司
公司．工廠：彰化市延平里岸頭巷11號

P267c

標籤改140x67mm/105.08.23

【成 分】:每ml中含有:
Dimenhydrinate.....50mg

【適應症】：
下列之疾患或狀態所引起之噁心、嘔吐、眩暈、暈動病Meniere`s症候群、放射線治療、手術後噁心、嘔吐。

【注意事項】：
請詳閱說明書

4 713889 002213

1ml×100Amp

• 鎮暈鎮吐劑 •

“大豐” 安暈吐 注射液 50毫克/毫升

Anwinto Injection 50mg/ml “T.F.”

【用法用量】：
通常成人1次1ml、1日2次肌肉內注射。

本藥限由醫師使用

衛署藥製字第026445號

批號:

有效期限:

GMP藥廠

大豐製藥股份有限公司
公司．工廠：彰化市延平里岸頭巷11號

1ml×100Amp
Anwinto Injection 50mg/ml “T.F.”

P267c