衛署藥製字第027196號

鎮咳祛痰劑

可 咳 定 錠

Kocat Tablets

【成　　分】：Each tablet contains：
Codeine Phosphate……..5mg
Terpine Hydrate…….……40mg

【適 應 症】：Lactose、Potato Starch、Povidone K-30
、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate。

【適 應 症】：鎮咳、祛痰（支氣管炎、咽喉炎所引起之咳嗽及喀痰）

【用法用量】：通常成人一日 3 次，1 次 1 錠，依年齡症狀適宜增減之。
本藥須由醫師處方使用。

【禁 忌】

1. 有重篤呼吸抑制之患者（會增強呼吸抑制）
2. 支氣管喘息發作中之患者（防礙氣道分泌）
3. 有重篤之肝障礙患者（會陷於昏睡）
4. 慢性肺疾患及續發性之心不全患者
5. 痙攣狀態（癲癇重肌症、破傷風、Strychnine 中毒）之患者（會出現脊椎之刺激效果）
6. 急性酒精中毒之患者
7. 對阿片生物鹼有過敏症之患者。
8. 服用本劑有肝損害之報告，故肝功能不好患者，請勿服用。

【警 語】

1. 對下列患者應慎重投與：
心、肝、腎、呼吸機能障礙之患者，有腦器質障礙之患者，休克中之患者，有代謝性酸血症之患者，甲狀腺機能低下症（粘液水腫等）之患者，副腎皮質機能低下症之患者，有藥物依存既往歷患者，乳兒、新生兒、高齡者及衰弱者。
2. 長期使用易致成癮。
3. 早產兒、1 歲以下嬰兒及 1～2 歲幼兒，不建議使用。
4. 2～12 歲兒童，依年齡減量使用
5. 肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

【副作用】

有依存性(反覆使用會生依存性)，連用中急激減量或中止時，會引起打噴嚏、流淚、發汗、噁心、嘔吐、下痢、腹痛、散瞳、頭痛、不眠、不安、振顫、關節痛、呼吸促迫等禁斷症狀出現，其他有呼吸抑制、瞌睡、眩暈、視調節障礙、發汗、排尿障礙、不整脈血壓變動。由本劑引起呼吸抑制時，可用麻藥拮抗劑（酒石酸）拮抗之。

【注意事項】

1.一般的注意：有催眠作用、眩暈等，故投與中之患者勿駕車或操作有危險性之機械。
2.妊婦之投與：
(1) 類似化合物類(嗎啡)之動物實驗報告曾有催畸形作用，妊婦或有妊娠可能性之婦人，能判斷治療上之有益性能勝過危險性時才可投與
(2) 分娩前之投與，會致使出生後之新生兒出現禁斷症（多動、神經過敏、不眠、振顫等）。
3.相互作用：與下列藥品併用或飲酒時，會增強作用故勿投與，不得不投與時應十分慎重投與：Phenothiazine 係誘導體、Barbitaric 酸誘導體等之中樞神經抑制劑，吸入麻醉劑，Monoamine 酸化酵素阻礙劑，三環系抗鬱劑、β-阻斷劑，Coumarin 係抗凝血劑。

【包　　裝】：6~1000 錠瓶裝。

【儲存條件】：室溫(15~25℃)儲存，避免陽光直射。

PIC/S GMP 優良藥廠
明大化學製藥股份有限公司
台中市外埔區水美里水美路 52 號
電話：04-26870115～7