

傷風熱因 顆粒

Modern Cold Granules

本劑係不含比林系藥品之綜合感冒劑，各主要成分在胃腸中極易被吸收，故感冒所引起之發熱、頭痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞等症狀能儘速緩解，一般感冒會導致體內維生素的大量消耗，而引起食慾不振、疲勞、倦怠感，本劑內含有維生素 B1、維生素 B2，以補充體內因感冒而導致的體力消耗，使感冒之諸症狀緩解，身體儘速恢復健康。

成 分：每一公克中含有：

Acetaminophen.....	150mg
Dextromethorphan hydrobromide	7.5mg
dl-Methylephedrine hydrochloride	5mg
Guaiacol Glyceryl Ether.....	32.5mg
Carbinoxamine maleate	1.25mg
Caffeine anhydrous	20mg
Thiamine mononitrate.....	3.75mg
Riboflavin	1.8mg

作 用：Acetaminophen 具中樞性解熱鎮痛作用，有強力速效之鎮痛解熱效果，Carbinoxamine maleate 為抗組織胺劑，因此感冒所引起之鼻塞或流鼻水等過敏症狀能迅速予以解除。

Dextromethorphan HBr 和 dl-Methylephedrine HCl 具有鎮咳作用，以防止因咳嗽而所引起的體力消耗。

Guaiacol Glyceryl Ether 最小有效量之咳嗽抑制效果……達 Codeine phosphate 之三倍，且能增加氣管內分泌之排泄，有顯著之祛痰作用。

適 應 症：感冒諸症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、發熱、頭痛)之緩解。

用法用量：15 歲以上 1 次 1 包(2.0g)，11~14 歲 2/3 包(1.3g)，8~10 歲 1 次 1/2 包(1.0g)，5~7 歲 1 次 1/3 包(0.7g)，3~4 歲 1 次 1/4 包(0.5g)，一日三次，飯後 30 分鐘內服用，本藥須經醫師、藥師、藥劑生指示使用。

酒精警語：若你每天喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問你的醫師你是否能服用 Acetaminophen 或其它鎮痛解熱劑，因為 Acetaminophen 可能造成肝損害。

注意事項：1. 本劑含有劇藥，應切實按照所定服用方法及劑量使用。
 2. 在就診中尚使用其他解熱、鎮痛或感冒藥者應避免重複使用。
 3. 應用本劑數次，仍未見症狀改善時，應即停用。
 4. 避免長期服用。
 5. 本劑應置於小孩伸手不及處。
 6. 服用本劑者應避免開車。

包 裝：2GM/包 6~500 包盒裝。

衛署藥製字第 027296 號

總經銷：七海企業股份有限公司
台北市復興南路一段 352 號 10C

製造廠：台裕化學製藥廠股份有限公司
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號