

【仿單】

富貴爽 乳膏 Eureson Cream

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第 027386 號

【成分】 每公克含有：
Hydrocortisone Acetate 10.0 mg
Urea 100.0 mg
賦形劑：
Cetyl Alcohol、Stearyl Alcohol、Methylparaben、
Edetate Disodium、Sodium Metabisulfite、Propylene
Glycol、Mineral Oil Light、Glycerin、Tween 60、
Sorbitan Monostearate、Purified Water、
Propylparaben

【適應症】 濕疹或皮膚炎、去角質。

【用法用量】 一天 1~2 次，塗於患部。

【副作用】 1. 局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、
青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎
縮、癬子、毛細管擴張。
2. 全身性：
庫欣式症候群(Cushing's syndrome，如滿月臉、
體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人
格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能
不足(secondary adrenal insufficiency，如疲
倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血
壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

【注意事項】 1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳
婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外
用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四
周或黏膜。
6. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於
大面積之體表或皮膚深部感染。
7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥
後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手，再戴隱形眼鏡。
10. 深部皮膚組織感染請就醫治療。
11. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇抗發炎劑不
可連續使用超過二星期。

【警語】 1. 對藥物各成分過敏者不得使用。
2. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能
障礙。
3. 癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使
用類固醇會使病情惡化。
4. 臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現
局部皮膚萎縮。
5. 皮膚的黴菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用
類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困
難。

【保存方式】 請貯存於 25°C 以下，且於期限內使用。

【包裝】 1000 公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝。

LT-ON010

福元化學製藥股份有限公司
新北市瑞芳區大寮路 95-1 號