正面

185mm

"世達" **利普樂** 膠囊 10公絲

（溴比得）

Lipolar Capsules 10 mg "S.T."

(Bromopride)

衛署藥製字第027457號

【簡　介】

本劑係一最新研究成功的胃腸道機能異常改善劑，對凡上腹部消化道引起的噁心、嘔吐、脹滿、痙攣痛等症狀，均能發揮其特殊的治癒效果，其對噁心、嘔吐之效能比Metoclopramide，Chlorpromazine更佳，而且更具有治療消化潰瘍之獨特作用。

【成　分】

Each Capsule Contains：Bromopride 10mg

【賦形劑】

Lactose、Crystalline Cellulose、Lactose PG 40#。

【膠囊殼】

Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、Tartrazine。

【特　長】

1. Anti-emetic：有強力止吐作用。
2. Anti-ulcerous：對Serotonin及Polymyxin B所致實驗性消化潰瘍有癒合作用。
3. Spasmolytic：對Histamin Acetylcholine或Barium Chloride引起的上腹部及結腸痙攣有緩解作用。
4. Eukinetic：促進胃內容物之排空以解除胃部食物停滯，且對胃腸道之運動異常有抑制及調節作用。
5. Local Anesthetic：有類似Oxethazaine之作用。高劑量對CNS才有鎮靜作用。

【適應症】

嘔吐、噁心、脹氣性消化不良、胃酸過多、上腹部痛、痙攣性結腸疾患、胃．十二指腸潰瘍、胃．十二指腸炎、裂孔赫尼亞、出血性直腸、結腸炎、消化管之X線檢查。

【用法用量】

通常成人一天3次，一次一粒，宜依年齡，症狀增減之，本藥須由醫師處方使用。

123mm

背面

【注意事項】

1. 禁忌：兩歲以下嬰兒、孕婦，以及服用鎮靜劑期間者除非有特別指定，否則不可使用。對有痙攣症的患者尤需更加小心。
2. 副作用：服用本藥品短時間內可能產生痙攣現象，在停止使用後短期間內可好轉。若併用抗帕金森氏症製劑可立即消除。
3. 交互作用：為了防止因交互作用引起對身體可能的影響，應避免與精神作用藥品(如鎮靜劑、抗抑鬱劑、抗焦慮劑鎮靜)安眠藥或酒精併用。其它種類的藥品也儘可能與使用本藥品之時間相互錯開。乃因胃腸道活動力之改變會影響一齊併用藥品的吸收。本藥品可加速與提高對Aspirin, Paracetamol, Quinidime, Diazepam，Lithium以及抗生素的吸收，然而對Digoxin之吸收則相對減少。
   Atropine與其它抗膽鹼素藥品(Anticholinergic drugs)可能減低本藥品對胃腸蠕動之功能。

【包　裝】

6～1000粒瓶裝。

【儲存條件】

儲存於25℃以下。

世達藥品工業股份有限公司

台中市西屯區工業區15路2號