達膚康乳膏

Dafucort Cream

本品所含之 Miconazole Nitrate 對於葡萄球菌(Staphylococcus)鏈球菌(Streptococcus)皮膚黴菌(Dermatophytes)酵母菌(Yeast)皆有殺菌作用，故對於混有細菌感染之黴菌炎症，具療效，另本品配合具有抗過敏及消炎作用之 Hydrocortisone 此兩種藥物可產生協同作用，對於難治癒之嬰兒性及感染性濕疹，可發揮其效果。

成　　分： 每公克中含：

Miconazole Nitrate……..20mg

Hydrocortisone……...…….10mg

Aloe Vera Juice……..5%

適 應 症： 治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬、汗斑；濕疹或皮膚炎。

用法用量： 少量塗於患部，輕擦之、每日 1～2 次。

注意事項：

1. 為須置於小孩接觸不到之處。。

2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。

4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。

6. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。

7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。

8. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。

9. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。

10. 深部皮膚組織感染請就醫治療。

11. 黴菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療程。

12. 一般黴菌治療一星期症狀會改善，股癬和體癬經二星期，足癬經四星期治療症狀若沒有改善應停藥立即就醫，即使若症狀有改善停藥後若病情復發應停藥立即就醫。

13. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇或非類固醇抗發炎劑，

不可連續使用超過二星期。

警　語　：

1. **對藥物各成份過敏者不得使用。**
2. **小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。**
3. **癬類或其它皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。**
4. **臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。**
5. **皮膚的黴菌感染有時不易與其它皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。**

賦形劑： Aloe Vera、Carbomer、Phosphoric Acid、Methylparaben、Propylparaben、Polyoxyl 40 Stearate、Cetyl Stearyl Alcohol、Petrolatum、Mineral Oil、Disodium Edetate、Sodium Hydroxide、Purified Water。

儲　存： 儲存於 25℃以下陰涼乾燥處。

包　裝： 1000 公克以下軟管裝、罐裝。

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第 027923 號

藥　　商：寶齡富錦生技股份有限公司

地　　址：台北市南港區園區街 3 號 16 樓

製 造 廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

地　　址：桃園市平鎮區興隆路 266 號