鎮咳、祛痰劑

“長安”咳冒糖漿

KUOMAU Syrup “C.A.”

本劑爲鎮咳、祛痰之治療液，服用方便，吸收快，服用後能迅速達到止咳，祛痰之效果。除 Codeine Phosphate 爲鎮咳作用外，更與抗過敏劑、祛痰劑及支氣管擴張劑配伍，更能彰顯因感冒、鼻炎、上呼吸道炎伴隨之咳嗽之治療效果。服用抗過敏藥後易出現思睡現象，而中樞神經興奮劑適可緩衝此作用，可將服用之副作用降低。

【配方說明】

成　分	藥　理　作　用
Codeine Phosphate	鎮痛、止咳、消除支氣管所受之刺激及抑制咳嗽中樞之反射性咳嗽。
Phenylephrine Hydrochloride	支氣管擴張，中樞神經興奮劑。
Pyrilamine Maleate	抗組織胺劑，用於治療過敏症，可抑制粘膜之腫脹及粘液之分泌。
Potassium Guaiacol Sulfonate	祛痰。

【成　分】 Each ml Contains：

Codeine Phosphate	0.8	mg
Phenylephrine Hydrochloride	0.4	mg
Pyrilamine Maleate	0.664	mg
Potassium Guaiacol Sulfonate	6.64	mg

【適 應 症】鎮咳、祛痰(支氣管炎、咽喉炎等引起之咳嗽及喀痰)。

【賦 形 劑】

Methylparaben，Butylparaben，Potassium Sorbate，New Coccine，Prune Flavour，Strawberry Essence，Sucrose，Sorbitol，Menthol，Glycerin，Purified Water。

【用法用量】成人：一天二次，每次 10 ml。小孩：6 - 12 歲，每日二次，每次 5 ml，2 - 6 歲，每日二次，每次 2.5 ml，1 歲以下小孩不得使用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【副 作 用】輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【注意事項】

1. 服用本劑數次仍未見症狀改善時應即停用。
2. 服用本劑應避免開車或操作須集中精神之工作，以免發生危險。
3. 須置於小孩接觸不到之處。
4. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
6. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
7. 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

【警　語】

1. 長期使用易致成癮。
2. 吸煙、慢性阻塞性肺疾（Chronic Obstructivc、Pulmonary Disease，包括氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續性或慢性咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽患者，請勿自行使用。
3. 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
4. 本劑含祛痰劑宜空腹服用。
5. (1) 早產兒、1 歲以下嬰兒及 1 ~ 2 歲幼兒，不建議使用；(2) 2 ~ 12 歲兒童，依年齡減量使用；(3)肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

【儲存條件】 25℃以下避光儲存。

【包　裝】 40 ~ 60 毫升塑膠瓶裝、玻璃瓶裝。　　衛署藥製字第 028052 號

長安化學工業股份有限公司
彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號