泌乳素抑制劑

"華興" 可力卜 膠囊 2.5 公絲（布克丁）

Crip Capsules 2.5mg "H.S."

(Bromocriptine)



《用法用量》

因泌乳素造成的症狀：應於飯中服用每日 1~2 粒，分 2~3 次服用。

帕金森氏症：應於飯中服用，每日 1~2 粒分 2 次服用。

《成　分》

每膠囊含：

Bromocriptine Mesylate……..2.5mg

《詳細用法用量》《注意事項》《警　語》

請詳閱說明書後使用。

本藥須由醫師處方使用

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 128 號

衛署藥製字第 028462 號（G-0260 號）

《適應症》

原發性腫瘤及藥物引起之乳漏症、因泌乳素引起之月經失調及不孕症、催乳素有關之男性機能減退、陽萎及精子過少引起之不孕症、催乳素分泌腺瘤、肢端肥大症、原發性及腦炎後的帕金森氏病、限用於因不得已之醫學理由須預防或抑制產後生理性泌乳之情形，例如：死胎、新生兒死亡或 HIV 感染之母親....等。本品不建議用於常規性抑制泌乳或緩解產後乳房疼痛及腫脹之症狀，此類症狀以非藥物方式（例如：支撐乳房、冰敷）及 / 或簡單之止痛藥即可充分緩解。

製造批號：

保存期限：