120x60mm


【成分】每錠含有：
Loperamide HCl 2mg
【適 應 症】
急慢性腹瀉、腸炎、
阿米巴痢疾、細菌
性痢疾。
【注意事項】
請詳閱說明書後使用。
衛署藥製字第028927號
本藥須由醫師處方使用。
4 713889 252021
“大豐”
1000T
●急慢性腹瀉 腸炎治療劑●
痢必治錠2毫克
LIPITIN TABLETS 2mg "T.F."
GMP藥廠
大豐製藥股份有限公司
公司・工廠：彰化市延平里岸頭巷11號
【用法用量】
急性腹瀉、成人初劑量
2錠，隨後每次1錠每日3
次，每日劑量不超過8錠，
一般48小時內可得予改善。
慢性腹瀉：通常成人初劑
量2錠，隨後1錠，每日
服用3次，直至止瀉，然
後視症狀及個人須要量繼
續維持服用，每日2～4
錠，分2次服用，服用劑
量一般每日不超過8錠，
如每日服用8錠，連續10
日未見症狀改善，則須加
以控制飲食或加以特殊方
法治療。
批　號：
保存期限：

120x60mm


【成分】每錠含有：
Loperamide HCl 2mg
【適 應 症】
急慢性腹瀉、腸炎、
阿米巴痢疾、細菌
性痢疾。
【注意事項】
請詳閱說明書後使用。
衛署藥製字第028927號
本藥須由醫師處方使用。
4 713889 252021
“大豐”
1000T
●急慢性腹瀉 腸炎治療劑●
痢必治錠2毫克
LIPITIN TABLETS 2mg "T.F."
GMP藥廠
大豐製藥股份有限公司
公司・工廠：彰化市延平里岸頭巷11號
【用法用量】
急性腹瀉、成人初劑量2錠，隨後每次1錠每日3次，每日劑量不超過8錠，一般48小時內可得予改善。
慢性腹瀉：通常成人初劑量2錠，隨後1錠，每日服用3次，直至止瀉，然後視症狀及個人須要量繼續維持服用，每日2～4錠，分2次服用，服用劑量一般每日不超過8錠，如每日服用8錠，連續10日未見症狀改善，則須加以控制飲食或加以特殊方法治療。
批　號：
保存期限：