

天良治痛感冒液

ZNTON CANUM SOLUTION "T.L.B."

【成分】 Each ml contains

CHLORPHENIRAMINE MALEATE	0.12 mg
DL-METHYLEPHEDRINE HCL	0.48 mg
ACETAMINOPHEN	12 mg
CAFFEINE ANHYDROUS	1.5 mg
POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE	3 mg

【賦形劑】 Sucrose、Ethanol、Caramel、Sodium Dehydroacetate、Carrot Flavor、Cherry Essence、Purified Water

【適應症】 緩解感冒之各種症狀(流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

【用法用量】 一日4次。成人每次服用8ml，12歲以上適用成人劑量。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
 - (一) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
 - (二) 服用本藥時不得併服其他藥品。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 五、本藥使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 六、不得併服含酒精飲料。

【警語】

- 一、服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
- 二、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (一) 12歲以下不建議自行使用。
 - (二) 曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
- 三、患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
- 四、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其它綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
- 五、若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
- 六、吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
- 七、不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生噪動。
- 八、不要服用本藥超過七日。
- 九、服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
- 十、服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
- 十一、肝毒性：
 - (一) 使用acetaminophen(paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen成分之藥品。
 - (二) 病人應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
- 十二、不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。
- 十三、過量：
 - (一) 服用過量acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、嘔吐、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
 - (二) 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
 - (三) Acetaminophen過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48-72小時才明顯可見。
- 十四、過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。
- 十五、嚴重皮膚反應：使用acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿疱病(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。
- 十六、本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：
 - (一) 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類藥品。
 - (二) 除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
- 十七、本藥含支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。
- 十八、本藥含咖啡因類成分，應注意下列事項：
 - (一) 應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心悸過速。
 - (二) 為避免造成依賴性及肝腎損害，不可長期使用。

【包裝】 8~4000毫升塑膠瓶裝、玻璃瓶裝。 衛署藥製字第029000號

【儲存條件】 15-30°C以下儲存。

製造廠：合誠化學製藥股份有限公司
桃園市平鎮區工業十路15號

委託者：天良生物科技企業股份有限公司
新北市汐止區大同路一段147號9樓
免費服務電話：0800-251-197

