仿單 速停痛錠 2020-5-14

size 21x10cm

10cm

21cm

PIC/S GMP優良藥品 衛署藥製字第029352號

Sutenten Sutenten Sutenten

“成大”速停痛錠

Sutenten Tablets “Chen Ta”

速停痛錠是加入了可以緩解發燒、頭痛、關節疼痛的Acetaminophen、Ethoxybenzamide、還有可以增加其效果的 Allylisopropylacetylurea，並配合可以幫助Acetaminophen緩解頭痛的Caffeine Anhydrous所製成的。速停痛錠是一種可以緩解疼痛的非匹林系的解熱鎮痛錠。

【有效成分及含量】：Each tablet contains：

有 效 成 分	含量	說 明
Allylisopropylacetylurea	25mg	鎮靜，與其他解熱鎮痛劑配合可增加鎮痛效果。
Acetaminophen	125mg	具解熱、鎮痛的效果。
Ethoxybenzamide	158.3mg	具消炎、解熱、鎮痛的效果。
Caffeine Anhydrous	25mg	增加Acetaminophen緩解頭痛之效果。

【其他成分(賦形劑)】：Potato Starch、Lactose、Sodium Starch Glycolate、Microcel、Magnesium Stearate、Sunset Yellow、Tartrazine、Povidone K-30。

【用途（適應症）】：解熱，鎮痛(頭痛、牙痛、月經痛、關節痛、神經痛、肌肉痛之緩解)。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：
1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 有蠶豆症的人。
3. 懷孕28週以上的婦女。
4. 18歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。
5. 曾因服用本藥或其他綜合感冒藥、解熱鎮痛藥後，引發氣喘的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1. 18歲以下。
2. 連續服用本藥超過7天，症狀未緩解的人。
3. 有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
4. 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、腎臟病、胃及十二指腸潰瘍。
5. 有肝臟疾病的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 曾有消化性潰瘍的人。
3. 正在服用其他解熱鎮痛、綜合感冒、鎮靜、鎮暈等藥品。
4. 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
5. 65歲以上的人。

四、其他使用上注意事項：
1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量。
4. 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
5. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
6. 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。
7. 可能會引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
8. 未經醫師處方或指示，不得長期服用。

【用法用量】：

年齡	使用劑量	服用次數
成人及18歲以上	1次2錠	1日3次，飯後30分鐘內服用，服用間隔為4小時以上
未滿18歲	請洽醫師診治，不宜自行服用	

【警 語】：

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮 膚	發疹、發紅、史蒂芬-強生症候群(Stevens-Johnson syndrome(幾乎很少)、毒性表皮溶解症(Toxic epidermal necrolysis(幾乎很少)
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃腸不適、胃腸出血
神經系統	頭暈、耳鳴
其 他	出血傾向、氣喘、體溫過低

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1. 若有任何不適情況發生。
2. 服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
3. 使用過量[每日超過4,000毫克(mg)]，或使用藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
4. 有過敏情形，例如臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其他皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包 裝】：6-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。
【類 別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。
【貯存條件】：25℃以下。

成大藥品股份有限公司
台南市麻豆區關帝廟80號