

政 德 優 寧 錠

3 公絲 (布 馬 平)

BROPAN Tab. "Gentle" 3mg (Bromazepam)

優寧錠具有強力抗不安作用，低劑量可以解除緊張和焦慮，高劑量具有鎮靜作用。藥理作用靜穩及抗不安作用約為 Diazepam 之 5 倍。本品口服使用後由 1 小時達最高血中濃度，在 72 小時約 70~80% 自尿中排泄。對情緒上之困擾引起之諸症，精神生理之不適等皆具療效。

成 分： 每錠含

主成分	
Bromazepam.....	3mg
賦形劑	
Lactose	
Starch	
Avicel	
New coccine	
Magnesium Stearate	

適 應 症： 焦慮狀態。

用法用量： 通常每次一錠，一天 2~3 次，嚴重症狀可增至一次 2~4 錠一天 2~3 次，應由最低劑量開始逐漸增量。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 急性狹隅角綠內障患者及重症筋無力患者禁止使用。
2. 腎、心、肝臟障礙，腦器質障礙，嬰幼兒、高齡及衰弱者等慎重投予。
3. 副作用：
 - ① 大量連續使用，會產生依賴性，大量連續投予後立即停藥或急速減量會產生禁斷症狀。
 - ② 出現步行失調、不眠、頭痛、性慾影響、振顫、霧視、構音障礙。(減少量即會消失)。
 - ③ 白血球減少、血壓下降，alkaline phosphatase 上升，urobilinogen 陽性及口渴、食慾不振、噁心、便秘、胃部不快、排尿困難、疲勞感、脫力感等肌緊張低下症狀。
 - ④ 若有過敏症狀發生應即中止用藥。
4. 孕婦及哺乳婦：
 - ① 懷孕三個月以內應衡量有益性與危險性而決定使用。
 - ② 妊娠後期會引起新生兒哺乳困難，肌緊張低下、嗜眠、黃疸增強等症狀。
 - ③ 分娩前連續使用產後新生兒有禁斷症狀產生。
 - ④ 本藥會在母乳中移行，新生兒因而引起嗜眠、體重減少現象。
5. 小兒投與之安全性尚未建立。
6. 併用藥物或飲酒會增強作用須慎重投予。
7. 會有睡意、注意力、集中力，反射運動功能低下，駕駛及操作機械必須注意。

警語：

1. 依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT) 臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性提高。
2. 併用 opioid 類藥品
Benzodiazepine 類藥品與 opioid 類藥品併用，可能導致重度鎮靜(profound sedation)、呼吸抑制、昏迷及死亡之風險，故僅限於其他治療方式均無法達到預期效果時，方可考慮併用，且應使用最低有效劑量及最短治療時間，並嚴密監測病人是否有呼吸抑制及鎮靜等相關症狀。

包 裝： 6~1000 粒盒、瓶裝。

貯存條件：

本藥品請置於緊密容器，室溫 25°C 下貯存。



政德製藥股份有限公司

雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號