

# “信東”腹膜灌洗液-甲 3%

## Peritoneal Dialysis Solution-A 3%

### “Sintong”

長期以來，急性腎功能衰竭的發作，被認為是危險可怕的，腎功能衰竭之患者，其腎臟解剖時可發現顯著的病變。如果能有迅速而適當的治療，這種病變，可因腎臟組織之再生而恢復正常的功能。

近來在體液及電解質生理學上的進展而有人工腎臟之發明。但因操作技術的複雜，使此法只限於有精良訓練的醫師、護士、技術員的醫療中心才能應用。於是許多學者繼續研究，終於發現腹膜可作透析膜，而腹腔可代替患者之腎小球膜及小管膜，應用為血透析法乃成為最簡單，最方便的一種操作。因此腹腔透析法，在臨牀上廣泛被應用於急性腎功能衰竭。

#### 【成 分】

主成分：每 ml. 澄清 Pyrogen-free 之滅菌溶液含有：

Sodium Chloride .....	5.65 mg.
Calcium Chloride · 2 H <sub>2</sub> O .....	0.29 mg
Magnesium Chloride · 6 H <sub>2</sub> O .....	0.153 mg.
Sodium Lactate .....	4.88 mg.
Dextrose · H <sub>2</sub> O .....	30 gm.
Sodium Bisulfite .....	0.06 mg.

賦形劑：Lactic Acid、Sodium Hydroxide、Water for Injection。

meq/L of Peritoneal Dialysis Solution:

Chloride .....	102.1	Sodium .....	140.78
Calcium .....	3.94	Magnesium .....	1.5
Bicarbonate .....	43.54	Glucose · H <sub>2</sub> O .....	30 gm.

#### 【適 應 症】

急性腎功能衰竭。

#### 【用法・用量】

腹膜灌洗，透析用，成人每透析一次需用二公升之透析液，孩童一公升即可。在12~36小時內作20~25次之透析，通常透析24小時即有良好之效果，但不宜超過36小時。事先應加注意，以免引起腹膜炎之危險。如需要時，可在2到3天後再行腹膜透析治療。

本藥限由醫師使用。

#### 【使用之注意事項】

##### (一)取用時：

- 1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。
- 2.若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

##### (二)輸液套選用及插入法：

- 1.請依輸液套使用方法正確使用。
- 2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免針割(Coring)產生碎片。
- 3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

#### 【注 意】

- 1.患有腹膜炎之病人，忌用本劑。
- 2.最近有過腹部手術者，亦不宜使用本劑。

#### 【包 裝】

4 L./瓶以下

衛署藥製字第029506號

G-0564



信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路22號